

除草剤

ゼータプラス1キロ粒剤
フェンキノトリオン・プロピリスルフロン粒剤

令和6年2月28日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「移植水稻」の使用時期「移植直後～ノビエ4葉期 ただし、移植後30日まで」を「移植直後～ノビエ4葉期 ただし、収穫60日前まで」に変更する。
- ・作物名「直播水稻」の使用時期「稲1葉期～ノビエ3.5葉期 ただし、収穫75日前まで」を「稲1葉期～ノビエ4葉期 ただし、収穫60日前まで」に変更する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数	プロピリスルフロンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	一年生雑草 多年生広葉雑草 イノノヤブガサ	移植時	1kg/10a	1回	田植同時散布機 で施用	2回以内	2回以内
		移植直後～ ノビエ4葉期 ただし、 収穫60日前まで					
直播水稻	一年生雑草 マツバ ホトケ ミズガヤツリ ウリカ ヒムシロ セリ アオドロ・藻類による 表層はく離	稲1葉期～ ノビエ4葉期 ただし、 収穫60日前まで			湛水散布 又は無人航空機 による散布		

使用上の注意事項の変更

【追加事項】

- ・前処理剤との体系で使用する場合には、雑草の発生状況をよく観察し、時期を失ないように適期に散布すること。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社