

殺虫剤
プレオフロアブル
ピリダリル水和剤

令和6年4月24日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「未成熟とうもろこし」に適用病害虫名「ツマジロクサヨトウ」を追加する。
- ・作物名「ばれいしょ」の適用病害虫名「ハスモンヨトウ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「かんしょ」の使用方法「散布」に適用病害虫名「ヒルガオハモグリガ」を追加する。
- ・作物名「かんしょ」の使用方法「無人航空機による散布」に適用病害虫名「ハスモンヨトウ」および「ヒルガオハモグリガ」を追加し、使用液量「0.8 L/10a」を「0.8~1.6 L/10a」に、「1.6 L/10a」を「1.6~3.2 L/10a」に変更する。
- ・作物名「キャベツ」および「ブロッコリー」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「レタス」に適用病害虫名「シロイチモジヨトウ」を追加する。
- ・作物名「立ちちしゃ」および「リーフレタス」を作物名「非結球レタス」に変更する。
- ・作物名「にがうり」に適用病害虫名「ウリノメイガ」を追加する。
- ・作物名「ほうれんそう」に適用病害虫名「シロイチモジヨトウ」を追加する。
- ・作物名「いちご」に適用病害虫名「アザミウマ類」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリダリルを含む農薬の総使用回数	
未成熟とうもろこし	材バカ ツマジロクサヨトウ	1000倍	100~300 L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	
ばれいしょ	材バカ	1000~2000倍		0.8~1.6 L/10a 1.6~3.2 L/10a				収穫7日前まで
	ハスモンヨトウ	16倍						
		32倍						
かんしょ	カジロシバ ハスモンヨトウ ヒルガオハモグリガ	1000~2000倍	100~300 L/10a	収穫7日前まで		2回以内		散布
		16倍	0.8~1.6 L/10a					無人航空機による散布
		32倍	1.6~3.2 L/10a					

次頁へ続く

前頁より続く

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリダリルを含む農薬の総使用回数
キャベツ	ウバ類 アムシ 材タバコガ コガ シロイロアザミヤ アザミヤ ハイメダカ ハスモンヨトウ ヨウムシ	1000倍	100~300 L/10a	収穫7日前 まで	2回以内	散布	2回以内
	アムシ コガ ハスモンヨトウ ヨウムシ	16倍	1.6L/10a			無人航空機 による散布	
		32倍	3.2L/10a			散布	
ブロッコリー	コガ シロイロアザミヤ ハスモンヨトウ	1000倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
	コガ ハスモンヨトウ	16倍	1.6L/10a			無人航空機 による散布	
		32倍	3.2L/10a			散布	
レタス	アザミヤ類 材タバコガ シロイロアザミヤ アザミヤ ハイメダカ ハスモンヨトウ	1000倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	4回以内	散布	4回以内
非結球レタス	材タバコガ アザミヤ ハイメダカ ハスモンヨトウ						
にがうり	ウリノメイガ ハスモンヨトウ						
ほうれんそう	アザミヤ類 シロイロアザミヤ ハスモンヨトウ			収穫前日 まで			
いちご	アザミヤ類 材タバコガ ハスモンヨトウ				4回以内		4回以内

使用上の注意事項の変更

【追加事項】

- ・非結球レタスには品種によっては薬害を生じるおそれがあるのであらかじめ薬害のないことを確かめたうえで使用すること。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社