

殺菌剤

S T ダコレート水和剤

ベノミル・TPN水和剤

令和6年4月24日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「はくさい」の、TPNを含む農薬の総使用回数を「3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)」に変更する。
- ・作物名「レタス」の、TPNを含む農薬の総使用回数を「5回以内(土壌灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内)」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベノミルを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数
はくさい	黒斑病 べと病 菌核病	1000倍	100~300 L/10a	収穫7日前 まで	2回以内	散布	3回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種後は2回以内)	3回以内 (は種又は定植前の 土壌混和は1回以内、 散布及び無人航空機散布 は合計2回以内)
レタス	べと病 灰色かび病 すそ枯病	1500倍		収穫14日前 まで	3回以内		5回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種後は4回以内)	5回以内 (土壌灌注は2回以内、 散布及び無人航空機散布 は合計3回以内)

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社