

殺虫剤
ゲットアウトWDG
 ジペルメトリン水和剤

令和6年7月24日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「だいず」に適用病害虫名「コガネムシ類」および「フタスジヒメハムシ」を追加する。
- ・作物名「だいず」の適用病害虫名「マメシクイガ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「あずき」に適用病害虫名「カメムシ類」を追加する。
- ・作物名「ばれいしょ」の適用病害虫名「ナストビハムシ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「てんさい」の適用病害虫名「ヨトウムシ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「キャベツ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「たまねぎ」に適用病害虫名「ネギハモグリバエ」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジペルメトリンを含む農薬の総使用回数
だいず	アブラムシ類 カメムシ類 コガネムシ類 ダイズキタバエ フタスジヒメハムシ マメシクイガ	3000倍	100~300 L/10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内
	マメシクイガ	24倍	0.8L/10a			無人航空機 による散布	
		48倍	1.6L/10a				
あずき	アブラムシ類 カメムシ類 ノメイガ類 マホクチゾウム	3000倍	100~300 L/10a			散布	
ばれいしょ	アブラムシ類 ナストビハムシ	2000~3000倍				無人航空機 による散布	4回以内
	ナストビハムシ	24倍	0.8L/10a				
		48倍	1.6L/10a				
		96倍	3.2L/10a				
てんさい	ヨトウムシ	750倍	25L/10a	収穫14日前 まで	4回以内	散布	4回以内
	カメノコハムシ テウサイビハムシ ヨトウムシ	2000~3000倍	100~300 L/10a			無人航空機 による散布	
	ヨトウムシ	24倍	0.8L/10a				
		48倍	1.6L/10a				
キャベツ	アムシ	3000倍	100~300 L/10a	収穫7日前 まで	5回以内	散布	5回以内
		48倍	1.6L/10a			無人航空機 による散布	
		96倍	3.2L/10a				
たまねぎ	アザミガキ類 ネギハモグリバエ	2000~3000倍	100~300 L/10a			散布	

次頁へ続く

前頁より続く

使用上の注意事項の変更

【追加事項】

- ・ 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ること。
 - ① 散布は各散布機種種の散布基準に従って実施すること。
 - ② 散布にあっては散布機種種に適合した散布装置を使用すること。
 - ③ 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
 - ④ 散布薬液の飛散によって自動車やカートを塗装等に影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意すること。
 - ⑤ 散布終了後は次の事項を守ること。
 - a 使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄すること。
 - b 機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。
- ・ 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意すること。

【変更事項】

- ・ ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
 - ① ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにすること。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しないこと。
 - ② 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業の散布時期などの情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社