

植物成長調整剤
住友ジベレリン粉末
ジベレリン水溶剤

令和6年7月24日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「愛媛果試第48号」、「清見」および「カラ」を追加する。
- ・作物名「紅まどんな」を「愛媛果試第28号」に変更する。
- ・作物名「かんきつ（不知火、ぽんかん、かぼす、はるみ、ワシントンネーブル、日向夏、すだち、平兵衛酢、長門ユズキチ（無核）、温州みかん、きんかん、紅まどんなを除く）」を「かんきつ（不知火、ぽんかん、かぼす、はるみ、ワシントンネーブル、日向夏、すだち、平兵衛酢、長門ユズキチ（無核）、温州みかん、きんかん、愛媛果試第28号、愛媛果試第48号、清見、カラを除く）」に変更する。
- ・作物名「かんきつ（苗木、ただし、温州みかんを除く）」に使用濃度「ジベレリン2.5ppm」を追加する。
- ・作物名「カラー」を「カラー（湿地栽培を除く）」に変更する。

【変更部分】

作物名	使用目的	使用濃度	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジベレリンを含む農薬の総使用回数
かんきつ (不知火、ぽんかん、 かぼす、はるみ、 ワシントンネーブル、 日向夏、すだち、 平兵衛酢、 長門ユズキチ(無核)、 温州みかん、 きんかん、 愛媛果試第28号、 愛媛果試第48号、 清見、カラを除く)	花芽抑制 による 樹勢の維持	ジベレリン 2.5ppm	200～700 L/10a	収穫後～3月	1回	立木全面散布 又は 枝別散布 (マシン油乳剤60～80倍 液に加用)	1回
		ジベレリン 25～50ppm	50～250 L/10a	収穫直後～ 収穫約1ヵ月後		立木全面散布 又は 枝別散布	
	落果防止		50～100 L/10a	開花始め～ 満開10日後		散布	
愛媛果試第28号 愛媛果試第48号 清見	花芽抑制 による 樹勢の維持	ジベレリン 2.5ppm	200～700 L/10a	収穫後～3月		立木全面散布 又は 枝別散布 (マシン油乳剤60～80倍 液に加用)	3回以内
		ジベレリン 25～50ppm	50～250 L/10a	収穫直後～ 収穫約1ヵ月後		立木全面散布 又は 枝別散布	
	落果防止		50～100 L/10a	開花始め～ 満開10日後		散布	
	水腐れ軽減	ジベレリン 0.5～1ppm	50～500 L/10a	着色終期 但し、 収穫7日前まで		果実散布	

次頁へ続く

前頁より続く

【変更部分】

作物名	使用目的	使用濃度	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ジベレリンを 含む農薬の 総使用回数
カラ	花芽抑制 による 樹勢の維持	ジベレリン 2.5ppm	200～700 L/10a	収穫後～3月	1回	立木全面散布 又は 枝別散布 (マシン油乳剤 60～80 倍 液に加用)	1回
		ジベレリン 25～50ppm	50～250 L/10a	収穫直後～ 収穫約1ヵ月後		立木全面散布 又は 枝別散布	
	落果防止		50～100 L/10a	開花始め～ 満開 10 日後		散布	
	水腐れ軽減	ジベレリン 0.5～1ppm	50～500 L/10a	着色終期 但し、 収穫 7 日前まで		果実散布	
かんきつ (苗木、ただし、 温州みかんを除く)	花芽抑制 による 樹勢の維持	ジベレリン 2.5ppm	200～700 L/10a	12～3月		立木全面散布 又は 枝別散布 (マシン油乳剤 60～80 倍 液に加用)	
		ジベレリン 25～50ppm	50～250 L/10a			立木全面散布 又は 枝別散布	
カラー (湿地栽培を除く)	生育促進	ジベレリン 50ppm	—	植付時		球根浸漬	2回以内
			50～150 L/10a	花茎伸長期		茎葉散布	

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。