

殺菌剤
カナメフロアブル
インピルフルキサム水和剤

令和6年9月11日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「トマト」および「ミニトマト」に適用病害虫名「褐色輪紋病」、「斑点病」を追加する。
- ・作物名「ばれいしょ」の希釈倍数「400倍」を「400～1000倍」に変更する。
- ・作物名「ねぎ」の希釈倍数「4000倍」、使用方法「散布」に適用病害虫名「白絹病」を追加する。
- ・作物名「さやえんどう」に適用病害虫名「うどんこ病」を追加する。
- ・作物名「りんご」に適用病害虫名「灰色かび病」を追加する。
- ・作物名「なし」の希釈倍数「4000倍」に適用病害虫名「胴枯病」を追加する。
- ・作物名「もも」の希釈倍数「4000倍」に適用病害虫名「褐さび病」を追加する。
- ・作物名「小麦」を追加し、それに伴い、作物名「麦類」を「麦類（小麦を除く）」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	イピルダフルを含む 農薬の 総使用回数
トマト ミニトマト	うどんこ病 褐色輪紋病 菌核病 すすかび病 灰色かび病 葉かび病 斑点病	4000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	4 回 以内	散布	4 回以内
ばれいしょ	黒あざ病	400～1000 倍	—	植付前	1 回	種いも 瞬間浸漬	4 回以内 (種いもへの処理は 1 回以内、 植付後は3 回以内)
	夏疫病	4000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	
ねぎ	黒斑病 白絹病 葉枯病				4 回 以内		株元散布
	さび病						
	黒腐菌核病						
	白絹病						
さやえんどう	うどんこ病 菌核病 さび病 灰色かび病	4000 倍				散布	

次頁へ続く

前頁より続く

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イピルダゾールを含む農薬の総使用回数
りんご	赤星病 うどんこ病 褐斑病 黒星病 黒点病 すす点病 すす斑病 灰色かび病 斑点落葉病 モミジ病	4000 倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	3 回以内
なし	黒斑病 胴枯病 輪紋病	4000 倍					
	赤星病 黒星病	4000～8000 倍					
もも	うどんこ病 褐さび病 黒星病	4000 倍					
	灰星病	4000～8000 倍					
麦類(小麦を除く)	雪腐小粒菌核病	2000～4000 倍	60～150 L/10a	根雪前	2 回 以内		4 回以内 (根雪前は2 回以内、 根雪後は2 回以内)
	うどんこ病	4000 倍		収穫7 日前 まで			
	赤さび病	4000～8000 倍					
小麦	雪腐小粒菌核病	2000～4000 倍		根雪前			5 回以内 (種子への処理は 1 回以内、 根雪前の散布は 2 回以内、 根雪後の散布は 2 回以内)
	うどんこ病	4000 倍					
	赤さび病	4000～8000 倍		収穫7 日前 まで			

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと

住友化学株式会社