

農林水産省登録
第23196号

殺虫剤

ワンリードSP箱粒剤

クロチアニジン・スピネトラム粒剤

令和6年9月11日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「稲（箱育苗）」のスピネトラムを含む農薬の総使用回数「3回以内（移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内）」を「3回以内（移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。
- ・作物名「湛水直播水稻」のスピネトラムを含む農薬の総使用回数「3回以内（は種時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内）」を「3回以内（は種時までの処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	ｸﾛﾅﾆｼﾞﾝ を含む 農薬の 総使用回数	ｽﾋﾟﾅﾄﾗﾑ を含む 農薬の 総使用回数
稲 (箱育苗)	イネズミムシ イネノメイガ ツマグロヨコバイ イネノミ コメテウ フタバネヨコバ イネノメイガ リバエ ウンカ類 コブノメイガ イネノミ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り 50g	は種前	1回	育苗箱の 床土又は 覆土に 均一に 混和する。	4回以内 (移植時までの 処理は1回以内、 本田での散布、 空中散布、 無人航空機散布は 合計3回以内)	3回以内 (移植時までの 処理は1回以内、 本田では 2回以内)
		高密度に は種する場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り 50～100g)					
		育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り 50g	は種時 (覆土前) ～移植当日		育苗箱の 上から 均一に 散布する。		
		高密度に は種する場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り 50～100g)					

次頁へ続く

前頁より続く

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	クハアジンを 含む 農薬の 総使用回数	スピロラム を含む 農薬の 総使用回数
湛水直播 水 稲	イネズミムシ イネノメイシ アザヒコヤカ ニカメイチュウ イネトムシ	1kg/10a	は種時	1 回	は種同時施 薬機を用い て土中施用 する	4 回以内 (は種時までの 処理は1 回以内、 本田での散布、 空中散布、 無人航空機散布は 合計3 回以内)	3 回以内 (移植時までの 処理は1 回以内、 本田では 2 回以内)

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社