

除草剤
住化バサグラン液剤(ナトリウム塩)
ベンタゾン液剤

令和6年10月30日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・ 作物名「移植水稻」の使用時期「移植後15～55日 但し 収穫50日前まで」を「移植後15日～収穫45日前まで」に変更する。
- ・ 作物名「直播水稻」の使用時期「は種後35～50日 但し 収穫50日前まで」を「は種後35日～収穫45日前まで」に変更する。

【変更後】

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用 回数	使用方法	ベンタゾン を含む 農薬の総 使用回数
			薬量	希釈水量			
移植水稻	一年生雑草 (イネ科を除く)、 マツバイ、 ホトメ、 ウリカ、 ホトメカ、 ミスガヤツリ、 ハラホトメカ、 クログワイ、 コキヤウ、 エゾノヤヌガサ、 スイ、 クサ	移植後15日～ 収穫45日前まで	500～700 mL/10a	70～100 L/10a	2回 以内	落水散布 又は ごく浅く 湛水して 散布	2回以内
直播水稻	一年生雑草 (イネ科を除く)、 マツバイ、 ホトメ、 ウリカ、 ホトメカ、 ミスガヤツリ、 ハラホトメカ、 クログワイ	は種後35日～ 収穫45日前まで					

次頁へ続く

前頁より続く

使用上の注意事項の変更

【変更】

- ・イネ科雑草には効果がないので、イネ科雑草の優占ほ場での使用はひかえること。
また、イネ科雑草が混在する場合はこれらに有効な除草剤との体系で使用する事。
- ・イネ科雑草には効果が劣るので、田植前後の土壌処理除草剤で一年生雑草を防除した後、多年生雑草及び一年生広葉雑草の防除を目的として使用する事。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。