殺虫剤
パダンSG水溶剤
カルタップ水溶剤

令和7年2月27日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「かぶ」を追加する。
- ・作物名「おうとう」を追加する。
- ・作物名「しそ」の使用時期「収穫7日前まで」を「収穫3日前まで」に変更する。
- ・作物名「なばな」を「なばな類」に変更する。
- ・作物名「かき」の適用病害虫名「カキノキマダラメイガ」を「フタモンマダラメイガ」に変更する。
- ・作物名「もも」を追加する。
- ・作物名「ネクタリン」を追加する。
- ・作物名「すもも」を追加する。
- ・作物名「大粒種ぶどう」を「ぶどう」に変更し、使用時期「収穫21日前まで」を「収穫14日前まで」に、本剤の使用回数およびカルタップを含む農薬の総使用回数「5回以内」を「2回以内」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	加タップを含む農薬の総使用回数
かぶ	キジノミムシ	1500倍	100~300 L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	7回以内 (は種時の 土壌混和は 1回以内、 散布は 3回以内、 株元散布は 3回以内)
おうとう	アメリカハトリ		200~700 L/10a	収穫前日まで	1回		1回
しそ	アザミヤ類	3000倍	100~300 L/10a	収穫3日前まで	2回以内		2回以内
なばな類	アブラムシ類 コガ			収穫7日前まで	3回以内		3回以内
かき	イガ か柿カ チャノキイロアザミヤ フタモンマダラメイガ	1500倍	200~700 L/10a	収穫45日前まで	4回以内		4回以内
	かハタムシカ	1500~ 3000倍					

事項に続く

前項より続く

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	カクタップ を含む 農薬の 総使用回数
もも ネクタリン すもも	アブラムシ類	1500 倍	200~700 L/10a	収穫 14 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
ぶどう	スカバ類 チャノキアザミマ フタバヒメコバエ				2 回以内		2 回以内

使用上の注意事項の変更

【変更事項】

- ・本剤を側条施用する場合は次の注意を守ること。
 - ③アルカリ性ペースト肥料との混和は有効成分が分解するおそれがあるので、混和可能が確認されているペースト肥料以外との混和はさけること。
- ・かき、ぶどうは樹勢の弱い場合には薬害を生じるおそれがあるので使用しないこと。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社