

殺虫剤
アディオン乳剤
ペルメトリン乳剤

令和7年3月12日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「だいず」の使用方法「無人航空機による散布」に適用病害虫名「ウコンノメイガ」、「ツメクサガ」、「フタスジヒメハムシ」および「マメハンミョウ」を追加する。
- ・作物名「はくさい」に適用病害虫名「ネキリムシ類」、使用方法「株元灌注」を追加する。
- ・作物名「はくさい」および「キャベツ」の適用病害虫名「アオムシ」および「ヨトウムシ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「ブロッコリー」の適用病害虫名「ネキリムシ類」の希釈倍数「8000倍」を「4000～8000倍」に、使用液量「0.5L/m²」を「0.5～1L/m²」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペルメトリンを含む農薬の総使用回数
だいず	アブラムシ類 かみし類 ウコンノメイガ ツメクサガ	3000倍	100～300 L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	フタスジヒメハムシ マメハンミョウ	24倍	0.8L/10a			無人航空機による散布	
はくさい	アブラムシ類 アオムシ ヨガ ハクサイダニ ヨトウムシ	2000倍	100～300 L/10a		5回以内	散布	5回以内
	ネキリムシ類	4000～8000倍	0.5～1L/m ²			株元灌注	
	アオムシ ヨトウムシ	32倍	1.6～3.2 L/10a			無人航空機による散布	
		64倍	3.2 L/10a				

次頁へ続く

前頁より続く

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペルトリンを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アブラムシ類 アオムシ コガ タバコシジメ ヨトウムシ	2000倍	100~300 L/10a	収穫3日前 まで	5回以内	散布	5回以内 (株元灌注は2回 以内)
	ネムシ類	4000~8000 倍	0.5L/m ²	収穫21日前 まで	2回以内	株元灌注	
	アオムシ ヨトウムシ	32倍	1.6~3.2 L/10a	収穫3日前 まで	5回以内	無人航空機 による散布	
ブロッコリー	コガ	2000倍	100~300 L/10a			5回以内	散布
	アブラムシ類	2000~3000 倍		0.5~1L/m ²	株元灌注		
	ネムシ類	4000~8000 倍	収穫7日前 まで				

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社