

植物成長調整剤
アブサップ液剤
アブシシン酸液剤

令和7年3月12日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「ぶどう（巨峰系4倍体品種）」を追加し、それに伴い「ぶどう（巨峰）」および「ぶどう（ピオーネ）」を削除する。
- ・「ぶどう（ポンタ）」を追加する。

【変更部分】

作物名	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アブシシン酸を含む農薬の総使用回数
ぶどう(巨峰系4倍体品種) ぶどう(ポンタ)	着色促進	100~ 200倍	1果房当り 2~10mL	着色始期~ 着色開始 2週間後	1回	果房散布	1回

使用上の注意事項の変更

【変更事項】

- ・本剤の使用に当たっては使用濃度、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるか、自ら事前に薬効及び薬害を確認した上で使用すること。

【追加事項】

- ・赤系品種に使用する場合は、効果が強く出過ぎて着色が進み過ぎるおそれがあるため、事前に薬効を確認した上で使用すること。

(効果の確認されている品種)

「巨峰」「ピオーネ」「安芸クイーン」「クイーンニーナ」「藤稔」「ポンタ」

- ・品種、栽培条件などによっては黒斑などの薬害が出るおそれがあるので、事前に確認した上で使用すること。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社