

殺菌剤
カナメフロアブル
インピルフルキサム水和剤

令和7年4月23日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「やまのいも」を追加する。
- ・作物名「にんにく」を追加する。
- ・作物名「ピーマン及びとうがらし類」を追加する。
- ・作物名「なす」を追加する。
- ・作物名「いちじく」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	インピルフルキサム を含む 農薬の 総使用回数
やまのいも	青かび病	200 倍	—	植付前	1 回	種いも瞬間 浸漬	1 回
にんにく	さび病 葉枯病	4000 倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布	4 回以内 (散布は 2 回以内、 株元散布は2 回 以内)
	白絹病					株元散布	
ピーマン及び とうがらし類	うどんこ病 灰色かび病		1L/株		4 回以内	散布	8 回以内 (散布は 4 回以内、 株元灌注は 4 回以内)
	白絹病					株元灌注	
なす	うどんこ病 菌核病 黒枯病 すすかび病 灰色かび病 褐色斑点病		100～300 L/10a		散布	4 回以内	
いちじく	さび病		200～700 L/10a				3 回以内

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと

住友化学株式会社