

殺菌剤
スクレアフロアブル
マンデストロビン水和剤

令和7年6月19日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「つるむらさき」の使用時期「収穫7日前まで」を「収穫前日まで」に変更する。
- ・作物名「しそ(花穂)」を追加する。
- ・作物名「ぶどう」に適用病害虫名「つる割病」、使用時期「休眠期」を追加し、マンデストロビンを含む農薬の総使用回数「3回以内」を「4回以内(休眠期は1回以内、生育期は3回以内)」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンデストロビンを含む農薬の総使用回数
つるむらさき	紫斑病	3000倍	100~300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
しそ(花穂)	斑点病	2000倍			2回以内		2回以内
ぶどう	つる割病	500~ 1000倍	200~700 L/10a	休眠期	1回		4回以内 (休眠期は 1回以内、 生育期は 3回以内)
	うどんこ病 晩腐病 黒とう病 灰色かび病	2000~3000 倍		収穫前日まで	3回以内		

使用上の注意事項の変更

【変更後】

- ・蚕に対して影響を及ぼすおそれがあるので、養蚕で使用する桑葉にかからないようにすること。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社