

殺虫剤
プレオフロアブル
ピリダリル水和剤

令和7年7月9日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「だいず」の使用方法「無人航空機による散布」に適用病害虫名「オオタバコガ」を追加する。
- ・作物名「さといも」、「だいこん」および「はくさい」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「キャベツ」の使用方法「無人航空機による散布」に適用病害虫名「オオタバコガ」を追加し、使用液量「1.6L/10a」を「1.6～3.2L/10a」に変更する。
- ・作物名「非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、みずな、なばな類を除く)」、「こまつな」、「みずな」および「なばな類」に適用病害虫名「シロイチモジヨトウ」を追加する。
- ・作物名「ブロッコリー」の使用方法「無人航空機による散布」の使用液量「1.6L/10a」を「1.6～3.2L/10a」に変更する。
- ・作物名「しゅんぎく」に適用病害虫名「シロイチモジヨトウ」を追加する。
- ・作物名「たまねぎ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリダリルを含む農薬の総使用回数
だいず	ハモグリバエ類 オオタバコガ	1000 倍	100～300 L/10a	収穫 7 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
	シロイチモジヨトウ ハモンヨトウ マシクイガ	1000～ 2000 倍				無人航空機による散布	
	オオタバコガ	8 倍	0.8L/10a			散布	
	ハモンヨトウ	8～16 倍				無人航空機による散布	
さといも	スズメガ類 ハモンヨトウ	1000～ 2000 倍	100～300 L/10a		2 回以内	散布	2 回以内
		32 倍	1.6～3.2 L/10a			無人航空機による散布	
		64 倍	3.2L/10a			無人航空機による散布	
だいこん	アオムシ カブラバチ コガ ヨウムシ	1000 倍	100～300 L/10a	収穫 14 日前 まで		散布	
	アオムシ コガ ヨウムシ	16 倍	1.6～3.2 L/10a			無人航空機による散布	
		32 倍	3.2L/10a			無人航空機による散布	

次頁へ続く

前頁より続く

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピリダリル を含む 農薬の 総使用回数	
はくさい	アムシ オオハコガ コガ ヨウムシ	1000 倍	100～300 L/10a	収穫 7 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内	
		16 倍	1. 6～3. 2 L/10a			無人航空機による散布		
		32 倍	3. 2L/10a					
キャベツ	ウバノ類 アムシ オオハコガ コガ シロイモジヨウ ギアザミワ ハマダラメイト ハモンヨウ ヨウムシ	1000 倍	100～300 L/10a			散布		
		16 倍	1. 6～3. 2 L/10a			無人航空機による散布		
	アムシ オオハコガ コガ ハモンヨウ ヨウムシ	32 倍	3. 2L/10a					
非結球あぶらな科葉 菜類(こまつな、みず な、なばな類を除く)	コガ シロイモジヨウ ハモンヨウ	1000 倍	100～300 L/10a			収穫前日 まで		散布
こまつな みずな						収穫 14 日前 まで		
なばな類								
ブロッコリー	コガ シロイモジヨウ ハモンヨウ	1000 倍	100～300 L/10a	収穫 7 日前 まで	散布			
	コガ ハモンヨウ	16 倍	1. 6～3. 2 L/10a		無人航空機による散布			
		32 倍	3. 2L/10a					
しゅんぎく	シロイモジヨウ ハモンヨウ	1000 倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	散布			
たまねぎ	シロイモジヨウ ギアザミワ ハモンヨウ			収穫 3 日前 まで				
	シロイモジヨウ ハモンヨウ					16 倍	1. 6～3. 2 L/10a	無人航空機による散布
			32 倍	3. 2L/10a				

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社