

農林水産省登録
第22910号

殺虫剤

ディアナSC
スピネトラム水和剤

令和7年10月1日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「みしまさいこ」を追加する。
- ・作物名「かんしょ」の適用病害虫名「ヒルガオハモグリガ」の希釈倍数「2500倍」を「2500～5000倍」に変更する。
- ・作物名「かんしょ」の使用方法「無人航空機による散布」に適用病害虫名「ヒルガオハモグリガ」を追加し、希釈倍数「32倍」および「64倍」をそれぞれ「32～40倍」および「40～80倍」に、使用液量「0.8L／10a」を「0.8～1.6L／10a」に変更する。
- ・作物名「はくさい」のスピネトラムを含む農薬の総使用回数「3回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内）」を「3回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内）」に変更する。
- ・作物名「キャベツ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加し、スピネトラムを含む農薬の総使用回数「3回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内）」を「3回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内）」に変更する。
- ・作物名「非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、チンゲンサイ、なばな類を除く)」、「こまつな」および「なばな類」に適用病害虫名「ハモグリバエ類」を追加する。
- ・作物名「カリフラワー」のスピネトラムを含む農薬の総使用回数「3回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内）」を「3回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内）」に変更する。
- ・作物名「たまねぎ」の使用方法「無人航空機による散布」に適用病害虫名「ハスモンヨトウ」を追加し、使用液量「1.6L／10a」を「1.6～3.2L／10a」に変更する。
- ・作物名「らっきょう」のスピネトラムを含む農薬の総使用回数「3回以内（種球浸漬は1回以内、散布は2回以内）」を「3回以内（植付前までの処理は1回以内、植付後は2回以内）」に変更する。
- ・作物名「にんじん」に適用病害虫名「キアゲハ」を追加する。
- ・作物名「トマト」および「ミニトマト」の希釈倍数「2500倍」に適用病害虫名「チバクロバネキノコバエ」を追加する。

次項へ続く

前項より続く

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ビートラムを含む農薬の総使用回数
みしまさいこ	ハスモンヨトウ	2500~5000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	4回以内 (1年間に2回以内)	散布	4回以内 (1年間に2回以内)
かんしょ	ナガミロタバ ハスモンヨトウ ヒルガホモグリガ	32~40倍	0.8~1.6L/10a		無人航空機による散布	2回以内	
		40~80倍	1.6L/10a				2回以内
はくさい	アザミカ類 ウカバ類 アオムシ オオタバコガ コナガ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2500~5000倍	100~300L/10a			散布	3回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内)
キャベツ	アザミカ類	50~200倍	セル成型育苗トレイ1箱 または ペーパーポット1冊 (30×60cm) 使用土壤約3~4L 当り0.5L	育苗期後半	1回	灌注	3回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内)
	アザミカ類 ウカバ類 ハモグリバエ類 アオムシ オオタバコガ コナガ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2500~5000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	
	アオムシ オオタバコガ コナガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	48倍	1.6~3.2L/10a			無人航空機による散布	
		96倍	3.2L/10a				
非結球あぶらな科 葉菜類 (こまつな、 チンゲンサイ、 なばな類を除く)	アザミカ類 ハモグリバエ類 コナガ ハスモンヨトウ	2500~5000倍	100~300L/10a		2回以内	散布	2回以内
こまつな	ハクサイアニ アザミカ類 ハモグリバエ類 アオムシ コナガ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2500倍 2500~5000倍					

次項へ続く

前頁より続く

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピネラムを含む農薬の総使用回数
なばな類	アザミウマ類 ハモグリバエ類 コガエ ハクサイダニ ハスモントウ						2回以内
カリフラワー	アザミウマ類 オムレ コガエ ハイダラノメイド ハスモントウ ヨウムシ	2500～5000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内)
たまねぎ	アザミウマ類 シロイモジヨウ ネギハモグリバエ ハスモントウ						2回以内
	アザミウマ類 ネギハモグリバエ ハスモントウ	48倍 96倍	1.6～3.2L/10a 3.2L/10a			無人航空機による散布	
らっきょう	ネギ類	2500倍	—	植付前	1回	30分間種球浸漬	3回以内 (植付前までの処理は1回以内、植付後は2回以内)
	アザミウマ類 ハモグリバエ類	2500～5000倍					
にんじん	キアゲハ ハスモントウ						
トマト ミニトマト	コナゴム類 チバクロバネキ/コバエ	2500倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	アザミウマ類 ハモグリバエ類 オオタバコガエ トマキバガ ハスモントウ	2500～5000倍					

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。