

殺菌剤

カナメフロアブル
インピルフルキサム水和剤

令和8年2月4日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- 作物名「ねぎ」の希釀倍数「4000倍」、使用方法「散布」に適用病害虫名「黒腐菌核病」および「小菌核病」を追加する。
- 作物名「とうとう」に適用病害虫名「褐色せん孔病」および「黒斑病」を追加する。
- 作物名「チューリップ」に適用病害虫名「皮腐病」、使用方法「散布」を追加し、インピルフルキサムを含む農薬の総使用回数「1回」を「4回以内（球根への処理は1回以内、植付後は3回以内）」に変更する。
- 作物名「りんどう」に適用病害虫名「葉枯病」および「花腐菌核病」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釀倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	インピルフルキサムを含む農薬の総使用回数	
ねぎ	黒腐菌核病 黒斑病 小菌核病 白絹病 葉枯病	4000倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	4回以内	散布	4回以内	
	さび病	4000~ 8000倍				株元散布		
	黒腐菌核病	4000倍				散布		
	白絹病	4000~ 8000倍				3回以内	3回以内	
とうとう	褐色せん孔病 黒斑病 灰星病	4000倍	200~700 L/10a	植付前	1回	15分間 球根浸漬	4回以内 (球根への処理は 1回以内、 植付後は 3回以内)	
チューリップ	皮腐病 葉腐病	100~200倍	—		発病前	散布		
	皮腐病	2000倍	100~300 L/10a					
りんどう	葉枯病 花腐菌核病	4000倍		発病初期	3回以内	散布	3回以内	
	黒斑病							

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと

住友化学株式会社