

殺虫剤  
アグロスリン乳剤  
シペルメトリン乳剤

令和8年5月13日付けで以下の適用拡大が登録されました。

## 【変更内容】

- ・作物名「だいず」の適用病害虫名「ジャガイモヒゲナガアブラムシ」を「アブラムシ類」に変更する。
- ・作物名「たまねぎ」の適用病害虫名「ネギハモグリバエ」を「ハモグリバエ類」に変更し、使用方法「無人航空機による散布」の使用液量「2.4L/10a」を「2.4~3.2L/10a」に変更する。
- ・作物名「ねぎ」および「わけぎ」の適用病害虫名「ネギハモグリバエ」を「ハモグリバエ類」に変更し、希釈倍数「2000倍」を「1000~2000倍」に変更する。
- ・作物名「にら」、「にら（花茎）」、「葉にんにく」および「らっきょう」の適用病害虫名「ネギアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更する。
- ・作物名「トマト」の適用病害虫名「オンシツコナジラミ」を「コナジラミ類」に変更する。
- ・作物名「なす」の適用病害虫名「オンシツコナジラミ」を「コナジラミ類」に、「ミナミキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更し、希釈倍数「2000倍」を「1000~2000倍」に変更する。
- ・作物名「きゅうり」の適用病害虫名「オンシツコナジラミ」を「コナジラミ類」に、「ミナミキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に、「トマトハモグリバエ」を「ハモグリバエ類」に変更し、希釈倍数「2000倍」を「1000~2000倍」に変更する。
- ・作物名「すいか」の適用病害虫名「ミナミキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更する。
- ・作物名「メロン」の適用病害虫名「ミナミキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に、「トマトハモグリバエ」を「ハモグリバエ類」に変更し、希釈倍数「2000倍」を「1000~2000倍」に変更する。
- ・作物名「ほうれんそう」の適用病害虫名「ミナミキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更、希釈倍数「2000倍」を「1000~2000倍」に変更し、適用病害虫名「ハクサイダニ」を追加する。
- ・作物名「かんきつ」の適用病害虫名「チャノキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更する。

## 【追加部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
だいず	アブラムシ類 かみし類 アズビヒカムシ マシクガ	2000倍	100~300 L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
たまねぎ	アザミウマ類 ハモグリバエ類 ヨイモシヨトウ				5回以内		5回以内
	アザミウマ類 ヨイモシヨトウ	48倍	2.4~3.2 L/10a	無人航空機による散布			

次項へ続く

前項より続く

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回 数	使用方法	シールドリ を含む 農薬の 総使用回数
ねぎ	シイモノヨトウ	1000倍	100~300 L/10a	収穫7日前ま で	5回以 内	散布	5回以内
	アザミヤカ類 アブラムシ類 ハダカリビア類 ネギコガ	1000~ 2000倍					
わけぎ	シイモノヨトウ	1000倍		収穫3日前ま で	2回以 内		2回以内
	アザミヤカ類 アブラムシ類 ハダカリビア類 ネギコガ	1000~ 2000倍					
にら	アザミヤカ類 コバネコバネ類	2000倍		収穫7日前ま で	3回以 内		3回以内
にら (花茎)	ハダカリビア類 ヨウムシ類 ネギコガ			収穫前日 まで			
葉にんにく	アザミヤカ類			収穫3日前ま で			
らっきょう	アザミヤカ類	1000倍		収穫前日 まで	5回以 内		5回以内
トマト	アブラムシ類 コゾリ類						
なす	アザミヤカ類	1000倍		収穫前日 まで	5回以 内		5回以内
	アブラムシ類 コゾリ類	1000~ 2000倍					
きゅうり	アザミヤカ類 ハダカリビア類	1000倍		収穫前日 まで	5回以 内		5回以内
	アブラムシ類 コゾリ類	1000~ 2000倍					
すいか	アザミヤカ類 アブラムシ類	1000倍	収穫7日前ま で	5回以 内	5回以内		
メロン	アザミヤカ類 ハダカリビア類	1000倍					
	アブラムシ類	1000~ 2000倍					
ほうれんそう	アザミヤカ類	1000倍	収穫7日前ま で	5回以 内	5回以内		
	アブラムシ類 ハサゲニ ヨウムシ	1000~ 2000倍					

次項へ続く

前項より続く

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社