

殺虫剤
アグロスリン水和剤
シペルメトリン水和剤

令和8年5月13日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「しょうが」を追加する。
- ・作物名「かんしょ」および「かんしょ（茎葉）」の適用病害虫名「ネギアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更する。
- ・作物名「トマト」および「ミニトマト」の適用病害虫名「オンシツコナジラミ」を「コナジラミ類」に変更する。
- ・作物名「なす」および「きゅうり」の適用病害虫名「オンシツコナジラミ」を「コナジラミ類」に、「ミナミキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更する。
- ・作物名「かんきつ」および「ぶどう」の適用病害虫名「チャノキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更する。
- ・作物名「うめ」に適用病害虫名「クビアカツヤカミキリ」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回 数	使用方法	シペルメトリン を含む 農薬の 総使用回数
しょうが	アブラムシ類	1000倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	2回以 内	散布	2回以内
かんしょ	コナジラミ類 ハムシ類 イチゴ エビガラスズメ ヨウムシ			1000 ~ 2000倍	収穫7日 前まで		5回以 内
	かんしょ(茎葉)	アブラムシ類 コナジラミ類 ハムシ類 イチゴ エビガラスズメ ヨウムシ			1000 ~ 2000倍		2回以 内

次頁へ続く

前頁より続く

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回 数	使用方法	シールドリン を含む 農薬の 総使用回数
トマト	アブラムシ類	1000 ~ 2000 倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	5 回以 内	散布	5 回以内
ミニトマト	コナジラミ類	2000 倍			2 回以 内		2 回以内
なす きゅうり	アザミヤカ類 アブラムシ類 コナジラミ類	1000 倍			5 回以 内		5 回以内
かんきつ	アザミヤカ類 アブラムシ類 カメムシ類 アゲヒコハ ヒメダカリバ ミカンゴキ成虫	2000 倍	200~700 L/10a	収穫7日前 まで	3 回以 内		3 回以内
ぶどう	コナジラミ類 アザミヤカ類	1000 ~ 2000 倍		収穫21日前 まで	5 回以 内		5 回以内
	アザミヤカ類	1000 ~ 3000 倍					
うめ	アブラムシ類 クビアカツトムキリ モモヒメコバエ	2000 倍		収穫7日前 まで	3 回以 内	3 回以内	

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社