

殺虫剤
ゲットアウトWDG
シペルメトリン水和剤

令和8年5月13日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「小麦」を追加し、それに伴い、作物名「麦類」を「麦類（小麦を除く）」に変更し、使用方法に「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「だいず」の使用法「散布」の適用病害虫名「フタスジヒメハムシ」を「ハムシ類」に変更する。
- ・作物名「ばれいしょ」の適用病害虫名「ナストビハムシ」を「ハムシ類」に変更し、使用方法「無人航空機による散布」の使用液量「0.8L/10a」を「0.8~1.6L/10a」に、「1.6L/10a」を「1.6~3.2L/10a」に変更する。
- ・作物名「てんさい」の適用病害虫名「カメノコハムシ」および「テンサイトビハムシ」を「ハムシ類」に変更し、使用方法「無人航空機による散布」に希釈倍数「96倍」を追加する。
- ・作物名「キャベツ」の使用法「無人航空機による散布」の使用液量「1.6L/10a」を「1.6~3.2L/10a」に変更する。
- ・作物名「たまねぎ」の適用病害虫名「ネギハモグリバエ」を「ハモグリバエ類」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農業の総使用回数			
小麦	アブラムシ類 ハモグリバエ	3000~ 4000倍	60~150L/10a	収穫21日 前まで	3回 以内	散布	3回以内			
	アブラムシ類	32倍 64倍	0.8~1.6L/10a 1.6~3.2L/10a			無人航空機による散布				
麦類 (小麦を除く)	アブラムシ類	3000~ 4000倍	60~150L/10a			3回 以内		3回 以内	散布	3回以内
		32倍 64倍	0.8~1.6L/10a 1.6~3.2L/10a						無人航空機による散布	
		3000倍	100~300L/10a						散布	
だいず	アブラムシ類 カハムシ類 コハムシ類 ハムシ類 ダズキタバエ マシクガ	3000倍	100~300L/10a			収穫7日 前まで		3回 以内	散布	3回以内
	ダズキタバエ マシクガ	24倍 48倍	0.8~1.6L/10a 1.6~3.2L/10a	無人航空機による散布						
ばれいしょ	アブラムシ類 ハムシ類	2000~ 3000倍	100~300L/10a	4回 以内	4回 以内	散布	4回以内			
	ハムシ類	24倍 48倍 96倍	0.8~1.6L/10a 1.6~3.2L/10a 3.2L/10a			無人航空機による散布				

次項へ続く

前項より続く

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアルマトリンを含む農薬の総使用回数
てんさい	ハシ類 ヨトウムシ	750倍	25L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	4回以内
		2000~3000倍	100~300L/10a				
		24倍	0.8~1.6L/10a			無人航空機による散布	
		48倍	1.6~3.2L/10a				
		96倍	3.2L/10a				
キャベツ	アムシ	3000倍	100~300L/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内
		48倍	1.6~3.2L/10a			無人航空機による散布	
		96倍	3.2L/10a			散布	
たまねぎ	アザミヤカ類 ハモグリバエ類	2000~3000倍	100~300L/10a			散布	

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社