

殺菌剤  
スターナ水和剤  
オキシリニック酸水和剤

令和8年5月20日付けで以下の適用拡大が登録されました。

## 【変更内容】

- ・作物名「さといも」を追加する。
- ・作物名「なばな類」を追加し、それに伴い、作物名「はなっこりー」を「なばな類」に統合し、削除する。
- ・作物名「さんとうさい」を「非結球はくさい」に変更する。
- ・作物名「メロン」および「かんきつ」を追加する。
- ・作物名「ブロッコリー」の適用病害虫名「黒斑細菌病」の希釈倍数「2000倍」を「1000～2000倍」に変更する。

## 【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキシリニック酸を含む農薬の総使用回数
さといも	軟腐病	1000倍	100～300 L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
なばな類		2000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内
非結球はくさい				収穫7日前まで			
メロン				収穫前日まで			
かんきつ	かいよう病	1000～2000倍	200～700 L/10a	収穫7日前まで	3回以内		3回以内
ブロッコリー	黒斑細菌病 花蕾腐敗病 軟腐病	2000倍	100～300 L/10a	収穫14日前まで	2回以内	2回以内	

## 使用上注意事項の変更

## 【追加事項】

みずかけな（水掛菜）に使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用すること。  
また、使用后14日間は入水しないこと。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社