

植物成長調整剤
アブサップ液剤
アブシシン酸液剤

令和8年6月10日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「ぶどう（巨峰）」および「ぶどう（ピオーネ）」を追加し、それに伴い、作物名「ぶどう（巨峰系4倍体品種）」を「ぶどう（巨峰、ピオーネを除く巨峰系4倍体品種）」に変更する。
- ・「ぶどう（神紅）」を追加する。

【変更部分】

作物名	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アブシシン酸を含む農薬の総使用回数
ぶどう (巨峰、ピオーネを除く 巨峰系4倍体品種)	着色促進	100～ 200倍	1果房当り 2～10mL	着色始期～ 着色開始 2週間後	1回	果房散布	1回
ぶどう(巨峰) ぶどう(ピオーネ)				果粒軟化始期～ 着色開始 2週間後			
ぶどう (神紅)				着色始期～ 着色開始 2週間後			

使用上の注意事項の変更

【追加事項】

・赤系品種に使用する場合は、効果が強く出過ぎて着色が進み過ぎるおそれがあるため、事前に薬効を確認した上で使用すること。

(効果の確認されている品種)

「巨峰」「ピオーネ」「安芸クイーン」「クイーンニーナ」「藤稔」「ポンタ」「神紅」
「オーロラブラック」

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社