

殺虫剤

スミロディー乳剤

フェンプロパトリン・MEP乳剤

令和8年6月10日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「かんきつ（みかんを除く）」および「みかん」の希釈倍数「1000～2000倍」に適用病害虫名「カイガラムシ類」、「シャクトリムシ類」および「ハマキムシ類」を追加する。
- ・作物名「かんきつ（みかんを除く）」および「みかん」の適用病害虫名「ミカンキイロアザミウマ」の希釈倍数「1000倍」を「1000～2000倍」に、適用病害虫名「ミカンハモグリガ」の希釈倍数「2000倍」を「1000～2000倍」に変更する。
- ・作物名「かんきつ（みかんを除く）」および「みかん」の適用病害虫名「ミカンハダニ」を「ハダニ類」に、適用病害虫名「チャノキイロアザミウマ」および「ミカンキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フェンプロパトリンを含む農薬の総使用回数	MEPを含む農薬の総使用回数
かんきつ (みかんを除く)	ハダニ類	1000倍	200～700 L/10a	収穫14日 前まで	3回以内	散布	9回以内 (噴射は5回以内、 散布及びくん煙は 合計4回以内)	3回以内 (樹幹処理は 1回以内)
	アザミウマ類 アブラムシ類 カイガラムシ類 カメムシ類 ケキスイ類 ケムシ類 シャクトリムシ類 ハマキムシ類 コアカケムシ ミカンハモグリガ	1000～ 2000倍						
みかん	ハダニ類	1000倍			4回以内			5回以内 (樹幹処理は 1回以内)
	アザミウマ類 アブラムシ類 カイガラムシ類 カメムシ類 ケキスイ類 ケムシ類 シャクトリムシ類 ハマキムシ類 コアカケムシ ミカンハモグリガ	1000～ 2000倍						

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社