

除草剤

ゼータジャガー1 キロ粒剤

フェンキノトリオン・プロピリスルフロンのペントキサゾン粒剤

令和8年7月22日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

・作物名「移植水稻」および「直播水稻」の使用方法「湛水散布」に「無人航空機による散布」を追加し、「湛水散布又は無人航空機による散布」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数	プロピリスルフロンの総使用回数	ペントキサゾンの総使用回数
移植水稻	一年生雑草 マツバ ホト ヘオモカ ミスガヤツリ ウリカ エゾノササガサ オモカ クダマ コサヤ ヒム セリ アミドロ・藻類による表層はく離	移植時	1kg/10a	1回	田植同時散布機で施用	2回以内	2回以内	2回以内
		移植直後～ ルビエ4葉期 ただし、 移植後 30日まで			湛水散布 又は 無人航空機 による散布			
直播水稻	一年生雑草 マツバ ホト ミスガヤツリ ウリカ ヒム セリ アミドロ・藻類による表層はく離	稲1葉期～ ルビエ4葉期 ただし、 収穫90日前 まで						

次項へ続く

前項より続く

使用上の注意事項の変更

【追加事項】

- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意を守ること。
- 散布は散布機種 of 散布基準に従って実施すること。
- 専用の粒剤散布装置によって湛水散布すること。
- 事前に薬剤の物理性に合わせて粒剤散布装置のメタリング開度を調整すること。
- 散布薬剤の飛散によって他の植物に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し、当該水田周辺部への飛散防止のため散布装置のインペラの回転数を調整し、ほ場の端から5m離れた位置からほ場内に散布すること。
- 水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないように十分注意すること。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないように特に注意すること。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社