

除草剤

ゼータジャガーフロアブル

フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ペントキサゾン水和剤

令和8年7月22日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「移植水稻」および「直播水稻」の使用方法「原液湛水散布」に「無人航空機による滴下」を追加し、「原液湛水散布又は無人航空機による滴下」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数	プロピリスルフロンを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	一年生雑草 マツバ ホト ヘオモガ ミスガヤツリ ウリカ エゾノササガサ オモガ コウキカ ヒムシ セリ アミドロ・藻類による表層はく離	移植後3日～ ルビエ4葉期 ただし、 移植後30日まで	500mL /10a	1回	原液 湛水散布 又は 無人航空機による 滴下	2回以内	2回以内	2回以内
直播水稻	一年生雑草 マツバ ホト ミスガヤツリ ウリカ ヒムシ セリ アミドロ・藻類による表層はく離	稲1葉期～ ルビエ4葉期 ただし、 収穫90日前まで						

次項へ続く

前項より続く

使用上の注意事項の変更

【変更事項】

- 本剤を無人航空機で滴下する場合は次の注意を守ること。
 - 滴下は使用機種の使用基準に従って実施すること。
 - 滴下に当っては散布装置のノズルを使用しないこと。
 - 作業中、薬液が漏れないように装置の十分な点検を行うこと。
 - 隣接するほ場に水稻以外の作物が栽培されている場合は無人航空機による本剤の滴下は行わないこと。
 - 水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないよう十分留意すること。
 - 薬剤滴下に使用した装置は十分洗浄し、薬剤タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。
 - 本剤の滴下に使用した無人航空機の散布装置は、水稻以外の作物への薬剤散布には使用しないこと。
 - 使用後3～4日間はそのまま湛水を保ち、田面を露出させないようにし、使用後7日間は落水、かけ流しはしないこと。
- また、入水は静かにおこなうこと。

【追加事項】

- 無人航空機による滴下で使用する場合は、飛散しないように特に注意すること。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社