

殺虫剤

住化スミチオン乳剤

MEP乳剤

令和8年8月26日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「稲」の希釈倍数「1000倍」の適用病害虫名「ヒメトビウンカ」を「ウンカ類」に変更する。
- ・作物名「たまねぎ」および「ねぎ」の希釈倍数「1000～2000倍」を「700～2000倍」に変更する。
- ・作物名「ねぎ」の希釈倍数「1000倍」を「700～1000倍」に変更する。
- ・作物名「トマト」に適用病害虫名「トマトキバガ」を追加する。
- ・作物名「なす」に適用病害虫名「クロテンコナカイガラムシ」を追加する。
- ・作物名「かぼちゃ」および「すいか」の希釈倍数「1000～2000倍」を「700～2000倍」に変更する。
- ・作物名「ほうれんそう」の適用病害虫名「ハウレンソウケナゴナダニ」を「ケナゴナダニ類」に変更する。
- ・作物名「りんご」および「もも」の適用病害虫名「ナシヒメシンクイ」および「モモシンクイガ」を「シンクイムシ類」に変更する。
- ・作物名「りんご」、「なし（有袋栽培）」および「なし（無袋栽培）」の適用病害虫名「アメリカシロヒトリ」を「ケムシ類」に、「クワコナカイガラムシ」を「カイガラムシ類」に変更し、希釈倍数「1500倍」を「1000～1500倍」に変更する。
- ・作物名「もも」の適用病害虫名「クワシロカイガラムシ」および「クワコナカイガラムシ」を「カイガラムシ類」に変更し、希釈倍数を「1000～1500倍」にする。
- ・作物名「うめ」および「おうとう」の適用病害虫名「アメリカシロヒトリ」を「ケムシ類」に変更する。
- ・作物名「大粒種ぶどう」および「小粒種ぶどう」の適用病害虫名「クワコナカイガラムシ」を「カイガラムシ類」に変更し、希釈倍数「1500倍」を「1000～1500倍」に変更する。
- ・作物名「かき」の適用病害虫名「アメリカシロヒトリ」を「ケムシ類」に変更する。
- ・作物名「茶」に適用病害虫名「ルビーロウムシ」を追加し、希釈倍数「1000倍」を「700～1000倍」に変更する。
- ・作物名「樹木類」の適用病害虫名「アメリカシロヒトリ」を「ケムシ類」に変更し、希釈倍数「1000倍」を「500～1000倍」に変更する。

次項へ続く

前項より続く

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む 農薬の 総使用回数	
稲	イシガレセンチュウ	100 倍	—	は種前	1 回	専用の種子消毒機を用いて乾燥種粒重量の3%の量の希釈液を種粒に吹付け処理又は塗沫処理	3 回以内 (種もみへの処理は1 回以内、育苗箱散布は1 回以内、本田では2 回以内)	
		1000 倍				6～72 時間浸漬		
	カメシ類 ニカメイチュウ	300 倍	25L/10a	収穫 21 日前 まで	2 回 以内	散布		
	ニカメイチュウ第2 世代 サカメイチュウ第3 世代	800～ 1000 倍	60～150 L/10a					
	アブラムシ類 ウカ類 カメシ類 アヲトウ イシガレセンチュウ イネツムシ イネトモイシ	1000 倍						
	ニカメイチュウ第1 世代 イネモグリバエ	1000～ 2000 倍						
	フタホトコヤガ	2000～ 4000 倍						
	イネモグリバエ	2500 倍						
	カメシ類 ニカメイチュウ	8 倍	800mL/10a					無人航空機 による散布
	カメシ類 イネツムシ イネモグリバエ イネモグリバエ ニカメイチュウ ヒメトウウカ フタホトコヤガ	30 倍	3L/10a					空中散布
	たまねぎ	アザミヤカ類	700～ 1000 倍	100～300 L/10a		収穫 14 日前 まで	散布	
		アブラムシ類	700～ 2000 倍					
ねぎ	アザミヤカ類 ネギコガ	700～ 1000 倍	5 回以 内					
	アブラムシ類	700～ 2000 倍						
トマト	アブラムシ類 オニジユウキバシテントウ トマトバガ	2000 倍	収穫前日 まで					
なす	アブラムシ類 テントウムシダマシ類 クロテコカイガラムシ	1000～ 2000 倍	収穫 14 日前 まで		3 回 以内	5 回以内		
かぼちゃ	アザミヤカ類	700～ 1000 倍	収穫 14 日前 まで		3 回 以内			
	アブラムシ類	700～ 2000 倍						

次項へ続く

前項より続く

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数		
すいか	アザミウマ類	700～1000 倍	100～300 L/10a	収穫3 日前まで	6 回以内	散布	6 回以内		
	アブラムシ類	700～2000 倍		ほうれんそう	収穫 21 日前まで		2 回以内	2 回以内	
アブラムシ類 ツグミナミ類	1000～2000 倍								
りんご	カミシ類 シクイミシ類 ハマキミシ類 ナグンバイ	1000 倍	200～700 L/10a	収穫 30 日前まで	3 回以内		3 回以内		
	カイガラムシ類	1000～1500 倍							
	アブラムシ類	1000～2000 倍							
なし (有袋栽培)	カミシ類 カミシ類 シクイミシ類 ハマキミシ類 ナグンバイ ナシバガ ナホガ	1000 倍		収穫 14 日前まで	6 回以内		6 回以内		
	カイガラムシ類	1000～1500 倍							
	アブラムシ類	1000～2000 倍							
なし (無袋栽培)	カミシ類 カミシ類 シクイミシ類 ハマキミシ類 ナグンバイ ナシバガ ナホガ	1000 倍		収穫 21 日前まで				6 回以内	6 回以内
	カイガラムシ類	1000～1500 倍							
	アブラムシ類	1000～2000 倍							
もも	クビアカツカミキリ	1000 倍		成虫発生初期 但し、収穫 3 日前まで				6 回以内 (樹幹処理は 1 回以内)	
	カミシ類 シクイミシ類 ハマキミシ類			収穫 3 日前まで					
	カイガラムシ類	1000～1500 倍							
	アブラムシ類 モミバゲリガ ナシバシクイ (心折防止)	1000～2000 倍							

次項へ続く

前項より続く

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
うめ	ケビアツカミキリ	1000 倍	200～700 L/10a	成虫発生初期 但し、収穫 3 日前まで	2 回以 内	散布	2回以内
	ケムシ類 ハマキムシ類			収穫 14 日前 まで			
	アブラムシ類	1000～2000 倍					
おうとう	ケムシ類 ハマキムシ類 ナゲルバイ	1000 倍		収穫 14 日前 まで	2 回以 内	散布	2回以内 (樹幹処理 及び灌注 処理は合計 1回以内)
	アブラムシ類	1000～2000 倍					
大粒種ぶどう	ハマキムシ類 キンケチブトゾウムシ成虫 ブドウウカミキリ	1000 倍		収穫 21 日前 まで			4回以内 (収穫終了後 から萌芽 までは 2回以内、 萌芽後は 2回以内)
	カイガラムシ類	1000～1500 倍					
	アブラムシ類 フタテヒメヨコバイ ブドウスカバ ブドウトリバ	1000～2000 倍					
小粒種ぶどう	ハマキムシ類 キンケチブトゾウムシ成虫 ブドウウカミキリ	1000 倍		収穫 90 日前 まで	3 回以 内	散布	3回以内 (樹幹処理は 2回以内)
	カイガラムシ類	1000～1500 倍					
	アブラムシ類 フタテヒメヨコバイ ブドウスカバ ブドウトリバ	1000～2000 倍					
かき	イガ類 カイガラムシ類 カメムシ類 ケムシ類 ハマキムシ類 ミガ類若齢幼虫 カキハムシガ カキボガ	1000 倍		収穫 30 日前 まで	1 回	30 分間 根部浸漬	1回
茶	ミノガ類 コカゲンハキ チャノボガ ルビロウムシ	700～1000 倍	200～400 L/10a	摘採 21 日前 まで	6 回以 内	散布	6回以内
樹木類	オオハシセンチュウ	500 倍	—	移植前			
	アブラムシ類 ゲンバイムシ類 ケムシ類 フタバウラギムシ	500～1000 倍	200～700 L/10a	—			

次項へ続く

前項より続く

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社