

殺虫剤

住化スミチオン水和剤 40

MEP水和剤

令和8年8月26日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「りんご」の適用病害虫名「クワコナカイガラムシ」を「カイガラムシ類」に、「モモシンクイガ」を「シンクイムシ類」に変更する。
- ・作物名「なし（有袋栽培）」、「なし（無袋栽培）」、「大粒種ぶどう」および「小粒種ぶどう」の適用病害虫名「クワコナカイガラムシ」を「カイガラムシ類」に変更する。
- ・作物名「おうとう」に適用病害虫名「ハマキムシ類」を追加し、希釈倍数「800倍」を「800～1000倍」に変更する。
- ・作物名「かき」の適用病害虫名「ドウガネブイブイ成虫」を「コガネムシ類成虫」に、「フジコナカイガラムシ」を「カイガラムシ類」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む 農薬の 総使用回数	
りんご	カミシ類 ギンモンハダガ	800～1000 倍	200～700 L/10a	収穫 30 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内	
	アブラムシ類 ハマキムシ類 カイガラムシ類 シンクイムシ類 リンゴスミシ	800～1200 倍						
なし (有袋栽培)	カミシ類 ナギゾラミ ナグンバイ ナシヒガ	800～1000 倍		収穫 14 日前まで	6 回以内		6 回以内	
	アブラムシ類 カイガラムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類	800～1200 倍						
なし (無袋栽培)	カミシ類 ナギゾラミ ナグンバイ ナシヒガ	800～1000 倍		収穫 21 日前まで				
	アブラムシ類 カイガラムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類	800～1200 倍						
大粒種ぶどう	コガネムシ類成虫 アカハシラミ フタシメコバ ブドウスカバ ブドウカミキリ	800～1000 倍		収穫 21 日前まで	2 回以内			4 回以内 (収穫終了後から萌芽までは 2 回以内、 萌芽後は 2 回以内)
	カイガラムシ類	800～1200 倍						

次項へ続く

前項より続く

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む 農薬の 総使用回数	
小粒種ぶどう	コガシム類成虫 アカシム類 フタタテコバ イ ブドウカシバ ブドウカシバ	800～1000 倍	200～700 L/10a	収穫 90 日前まで	2 回以内	散布	4 回以内 (収穫終了後から萌芽までは 2 回以内、 萌芽後は 2 回以内)	
	カイガラムシ類	800～1200 倍						
おうとう	ハムシ類 ハムシ類	800～1000 倍		収穫 14 日前まで			2 回以内 (樹幹処理及び 灌注処理は 合計 1 回以内)	
かき	オオワタカイガラムシ若 齢幼虫	800 倍		収穫 30 日前まで	3 回以内			3 回以内 (樹幹処理は 2 回以内)
	イガ 類 カメムシ類 コガシム類成虫	800～1000 倍						
	カイガラムシ類 ハムシ類	800～1200 倍						

使用上の注意事項の変更

【注意事項の追加】

- ・りんごのクワコナカイガラムシ以外のカイガラムシ類およびモモシンクイガ以外のシンクイムシ類に使用する場合は、希釈倍数 800～1000 倍で使用する事が望ましい。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社