

農林水産省登録
第24514号

殺虫殺菌剤
スタウトアレス箱粒剤
オキサゾスルフィル・イソチアニル粒剤

令和8年9月9日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「稲」に適用病害虫名「フタオビコヤガ」を追加する。
- ・作物名「稲（箱育苗）」に適用病害虫名「カメムシ類」および「イネカラバエ」、使用時期「移植当日」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	オキサゾスルフィル を含む 農薬の 総使用回数	イソチアニル を含む 農薬の 総使用回数
稲	いもち病 イネノミドリムシ イネミズウメ カメムシ類 フタオビコヤガ	1kg/10a	移植時	1回	側条施用	1回	3回以内 (直播での場合は種時又は 移植時までの処理は 1回以内、 本田では2回以内)

次頁へ続く

前頁より続く

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	杆状スルフィ を含む 農薬の 総使用回数	イザミル を含む 農薬の 総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 内穎褐変病 苗立枯細菌病 苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 穂枯れ (ごま葉枯病菌) もみ枯細菌病	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り 50g	は種前	1回	育苗箱の 床土又は 覆土に均一に 混和する。	1回	3回以内 (移植時までの処理は 1回以内、 本田では2回以内)
	付コ類 ウカ類 イネツムシ イネトコイシ イネヒメガリバエ イネミスジウシ コブノメイガ ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ アザヒコヤカ	高密度に は種する場合は 1kg/10a(育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り 50～100g)					

次頁へ続く

前頁より続く

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チザグスルフィルを含む農薬の総使用回数	イソチアールを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 内穎褐変病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) もみ枯細菌病 イグ 類 ウカ類 イトムシ イト 甲虫 イトハダニ イトミミズ コブノミダ ツマゲロコバエ ニカメイチュウ フタバネコバエ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1 箱当り 50g	は種時 (覆土前) ～移植当日	1 回	育苗箱の上から均一に 散布する。	1 回	3 回以内 (移植時までの処理は 1 回以内、 本田では 2 回以内)
	高密度に は種する場合は 1kg/10a(育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1 箱当り 50～100g)						
	苗立枯細菌病 苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌)	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1 箱当り 50g	は種時 (覆土前)				
	高密度に は種する場合は 1kg/10a(育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1 箱当り 50～100g)						
	カミシ類 イトハダニ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1 箱当り 50g	移植当日				
		高密度に は種する場合は 1kg/10a(育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1 箱当り 50～100g)					

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社