

殺虫剤  
**ベストガード粒剤**  
ニテンピラム粒剤

令和8年9月9日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「しゅんぎく」の適用病害虫名「マメハモグリバエ」を「ハモグリバエ類」に変更する。
- ・作物名「ねぎ」の適用病害虫名「ネギアザミウマ」を「アザミウマ類」に、「ネギハモグリバエ」を「ハモグリバエ類」に変更する。
- ・作物名「わけぎ」および「あさつき」の適用病害虫名「ネギハモグリバエ」を「ハモグリバエ類」に変更する。
- ・作物名「なす」、「すいか」および「メロン」の適用病害虫名「ミナミキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更する。
- ・作物名「いちご」の適用病害虫名「チバクロバネキノコバエ」を「クロバネキノコバエ類」に変更し、使用方法「生育期株元散布」を「株元散布」に変更する。

次項へ続く

前項より続く

## 【変更部分】

| 作物名         | 適用病害虫名                      | 使用量                                                            | 使用時期           | 本剤の<br>使用回<br>数 | 使用方法         | ニロバ<br>ラム<br>を含む<br>農薬の<br>総使用回数                  |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|
| しゅんぎく       | アブラムシ類<br>コナジラミ類<br>ハモグリバエ類 | 9kg/10a                                                        | 定植時            | 1回              | 植溝処理<br>土壌混和 | 2回以内<br>(定植時の<br>土壌混和は<br>1回以内、<br>株元処理は<br>1回以内) |
|             |                             |                                                                | 収穫3日<br>前まで    |                 | 生育期<br>株元処理  |                                                   |
| ねぎ          | アザミウサ類<br>ハモグリバエ類           | 5g/培土L                                                         | は種時            |                 | 育苗培土<br>混和   | 4回以内<br>(定植時までの処理<br>は<br>1回以内、<br>定植後は<br>3回以内)  |
|             | アザミウサ類                      | 6kg/10a                                                        |                |                 | 作条処理<br>土壌混和 |                                                   |
|             |                             | セル成型育苗トレイ1箱<br>またはパーパポット1冊<br>(30×60cm、使用土壌<br>約3～4L) 当り 50g   | 育苗期後半<br>～定植当日 |                 | 散布           |                                                   |
|             |                             | アザミウサ類<br>クロバネキノコバエ類<br>ハモグリバエ類                                | 6kg/10a        |                 | 定植時          |                                                   |
|             | アザミウサ類<br>ハモグリバエ類           | 収穫前日<br>まで                                                     |                | 3回<br>以内        | 株元処理         |                                                   |
| わけぎ<br>あさつき | ハモグリバエ類                     |                                                                | 定植時            |                 | 植溝処理<br>土壌混和 | 1回                                                |
| なす          | アブラムシ類                      | 5g/培土L                                                         | は種時又は鉢<br>上げ時  | 1回              | 育苗培土<br>混和   | 4回以内<br>(定植時までの処理<br>は<br>1回以内、<br>定植後は<br>3回以内)  |
|             | アブラムシ類<br>コナジラミ類            | 1g/株                                                           | 育苗期            |                 | 株元処理         |                                                   |
|             |                             | セル成型育苗トレイ1箱<br>またはパーパポット1冊<br>(30×60cm、使用土壌<br>約1.5～4L) 当り 50g | 育苗期後半          |                 | 散布           |                                                   |
|             | アザミウサ類<br>アブラムシ類<br>コナジラミ類  | 1～2g/株                                                         | 定植時            |                 | 植穴処理<br>土壌混和 |                                                   |
|             | アブラムシ類                      | 2g/株                                                           | 収穫前日<br>まで     | 3回<br>以内        | 生育期<br>株元散布  |                                                   |
| すいか<br>メロン  | アブラムシ類<br>コナジラミ類            | 1g/株                                                           | 育苗期            | 1回              | 株元処理         |                                                   |
|             | アザミウサ類<br>アブラムシ類<br>コナジラミ類  | 1～2g/株                                                         | 定植時            |                 | 植穴処理<br>土壌混和 |                                                   |
| いちご         | アブラムシ類                      | 1g/株                                                           |                |                 |              | 3回<br>以内                                          |
|             | クロバネキノコバエ類                  | 1～2g/株                                                         |                |                 |              |                                                   |

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社