

農林水産省登録
第24615号

殺虫殺菌剤

スタウトアレスモンガレス箱粒剤

オキサゾスルフィル・イソチアニル・インピルフルキサム粒剤

令和8年10月7日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「稲」に適用病害虫名「イネドロオイムシ」、「イネミズゾウムシ」、「ニカメイチュウ」および「フタオビコヤガ」を追加する。
- ・作物名「稲（箱育苗）」に適用病害虫名「疑似紋枯症（褐色菌核病菌）」、「疑似紋枯症（褐色紋枯病菌）」、「疑似紋枯症（赤色菌核病菌）」、「カメムシ類」、「イネカラバエ」、「イネヒメハモグリバエ」および「ケラ」、使用時期「移植当日」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	オキサゾスルフィル を含む 農薬の 総使用回数	イソチアニル を含む 農薬の 総使用回数	インピルフルキサム を含む 農薬の 総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 イネドロオイムシ イネミズゾウムシ ニカメイチュウ フタオビコヤガ	1kg/10a	移植時	1回	側条施用	1回	3回以内 (直播での は種時 又は 移植時まで の処理は 1回以内、 本田では 2回以内)	1回

次頁へ続く

前頁より続く

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	杆状バクテリア を含む 農薬の 総使用回数	イピラダゾール を含む 農薬の 総使用回数	イピラダゾール を含む 農薬の 総使用回数
稲 (箱育苗)	苗立枯細菌病 苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌)	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り 50g	は種時 (覆土前)	1回	育苗箱の 上から 均一に 散布する。	1回	3回以内 (移植時まで の処理は 1回以内、 本田では 2回以内)	1回
		高密度に は種する場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り 50～100g)						
	いもち病 白葉枯病 内稃褐変病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) もみ枯細菌病 紋枯病 付コ類 ウカ類 イネムシ イネトコイシ イネミズウシ コブノメイガ ツマゲロコバエ ニカメイチュウ フタバコヤガ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り 50g	は種時 (覆土前) ～移植当日					
		高密度に は種する場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り 50～100g)						

次頁へ続く

前頁より続く

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チザルギルを含む農薬の総使用回数	イザミルを含む農薬の総使用回数	イピルダゾールを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	疑似紋枯症 (褐色菌核病菌) 疑似紋枯症 (褐色紋枯病菌) 疑似紋枯症 (赤色菌核病菌) カメシ類 イカリバエ イカリバエ イカリバエ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り 50g	移植当日	1回	育苗箱の上から 均一に 散布する。	1回	3回以内 (移植時までの処理は 1回以内、 本田では 2回以内)	1回
		高密度に は種する場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り 50～100g)						

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社