

〔ポリオキシン水溶剤〕

第 1 5 1 7 6 号

性 状：淡褐色水溶性細粒

毒 性：普通物

危 険 物：—

有効年限：6 年

包 装：100 g × 50 袋

ポリオキシン® A L 水溶剤 「科研」

有効成分：ポリオキシン複合体……………50.0% （ポリオキシンBとして 500,000AmBu/g）

ポリオキシンは科研製薬㈱等の登録商標

〔適用と使用方法〕

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用時期*	総使用回数*	使用方法
きゅうり	灰色かび病 うどんこ病	5000 倍	前日	3 回	散布
かぼちゃ	うどんこ病	2500倍	7 日前		
トマト	灰色かび病 葉かび病	2500～5000 倍	前日		
なす	灰色かび病 すすかび病	2500倍			
いちご （露地栽培）	灰色かび病 うどんこ病	5000倍	3 日前	本 剤：5 回 ポリオキシン：5 回 （水和剤は 3回以内）	
いちご （施設栽培）			7 日前		
メロン	つる枯病	10～50倍		7 日前	本 剤：1 回 ポリオキシン：5 回 （#1）
		つる枯病 うどんこ病	1000～2000倍		
すいか	うどんこ病		前日	5 回	散布
はくさい	黒斑病	2500倍	7 日前		
レタス	菌核病		21日前		
キャベツ	黒すす病	20倍	は種前	本 剤：1 回 ポリオキシン：4 回 （#2）	10分間種子浸漬
		1000倍	は種覆土後		セル成型育苗トレイ（30×60cm）1 箱 当り500mL灌注する
		2500倍	子葉展開期以降	本 剤：2 回 ポリオキシン：4 回 （#2）	
にら	白斑葉枯病	1500倍	14日前	3 回	散布
きく	白さび病	2500倍	発病初期	5 回	
カーネーション	斑点病	2500～5000倍			
ゆり	葉枯病	2500倍			
グラジオラス	赤斑病 ボトリチス病				
花き類 （草本植物） ・観葉植物	灰色かび病 黒斑病 うどんこ病				
りんどう	葉枯病				

菌