

平成20年6月18日

農家の皆様へ

住友化学株式会社

「住化バサグラン粒剤」3kgの製品ラベル誤表示に関するお知らせ

この度「住化バサグラン粒剤」3kgの一部のロットにおいて製品ラベルに誤表示があることが判明いたしました。（下記「2.製品ラベル誤表示の内容」および別紙参照）

日頃「住化バサグラン粒剤」をご愛用の農家の皆様に対しまして大変ご迷惑をおかけしますことを、先ずは心よりお詫び申し上げます。

なお、今回の誤表示に基づいて既に本剤をご使用いただいていたとしても、食品の安全性に問題を生じるおそれはありませんが、従来からの登録の通り移植水稻の適用内容に従った適正使用をお願い申し上げます。（本剤使用1回の厳守をお願い申し上げます。）

また、対象製品は「住化バサグラン粒剤」の以下に示すロット製品のみであり、その他のメーカー様が販売されているバサグラン粒剤（ヤシマバサグラン粒剤、三共バサグラン粒剤、ホクコーバサグラン粒剤、クミアイバサグラン粒剤、BASFバサグラン粒剤）は現登録内容に沿った適正ラベル品であることを申し添えさせていただきます。

ご不明な点がございましたら、お買い上げいただいたJA・販売店もしくは弊社までお問い合わせを賜りたくお願い申し上げます。

今後はこのような事態が起これぬよう万全を期す所存ですので、ご容赦を賜り引き続きのご愛顧をお願い申し上げます。

記

1. 対象製品

（1）農薬名

「住化バサグラン粒剤（ナトリウム塩）」（登録番号：第16117号）

3kg / 袋

（2）対象製品の製造ロットおよび有効期限

ロット	有効期限	ロット	有効期限	ロット	有効期限	ロット	有効期限	ロット	有効期限
F7E18	10.10	F7K20	11.10	F7K24	11.10	F8E08	11.10	F8E13	11.10
F7K16	11.10	F7K21	11.10	F8C18	11.10	F8E09	11.10	F8E14	11.10
F7K17	11.10	F7K22	11.10	F8C19	11.10	F8E10	11.10	F8E15	11.10
F7K19	11.10	F7K23	11.10	F8C20	11.10	F8E12	11.10	F8E16	11.10
F8E19	11.10								

2 . 製品ラベル誤表示の内容

登録申請中の「飼料用移植水稻」の適用が記載（現段階で未登録）

別紙（誤表示ラベルと適正ラベルの比較）参照

3 . 本件に関するお問い合わせ先

住友化学株式会社 アグロ事業部 普及部お客様相談室 0 1 2 0 - 6 7 7 - 0 8 8

（フリーダイヤル）

0 5 7 0 - 0 5 8 - 6 6 9

（ナビダイヤル）

以上

別紙 「住化バサグラン粒剤（ナトリウム塩）」 3 k g の誤表示ラベルと適正ラベルの比較

(誤)

【適用雑草と使用方法】 *印は収穫物への残留回避のため、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	総使用回数*	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ、ホタルイ ウリカワ、ミズガヤツリ ヘラオモダカ、オモダカ	移植後15~50日 (但し収穫60日前まで)	砂壤土 ~ 粘土 減水深 1.5cm/日 以下	3~4 kg/10a	本剤: 1回 ベンタゾン: 2回	全域(九州を除く)の普通期 及び早期栽培地帯
		移植後15~40日 (但し収穫60日前まで)				九州の普通期及び早期栽培 地帯
	クログワイ	移植後15~35日 (但し収穫60日前まで)				東北、北陸、関東・東山・東海 の普通期栽培地帯
	エゾノサヤマカグサ	移植後15~55日 (但し収穫60日前まで)				北海道
	シズイ	移植後25~55日 (但し収穫60日前まで)				東北
飼料用 移植水稲	水田一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ、ホタルイ ウリカワ、ミズガヤツリ ヘラオモダカ、オモダカ	移植後15~50日 (但し収穫30日前まで)	砂壤土 ~ 粘土 減水深 1.5cm/日 以下	3~4 kg/10a	本剤: 2回 ベンタゾン: 2回	全域(九州を除く)の普通期 及び早期栽培地帯
		移植後15~40日 (但し収穫30日前まで)				九州の普通期及び早期栽培 地帯
	クログワイ	移植後15~35日 (但し収穫30日前まで)				東北、北陸、関東・東山・東海 の普通期栽培地帯
	エゾノサヤマカグサ	移植後15~55日 (但し収穫30日前まで)				北海道
	シズイ	移植後25~55日 (但し収穫30日前まで)				東北

【使い方】

- 落水散布又はごく浅い湛水散布。
- 移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用する。

(正)

【適用雑草と使用方法】 *印は収穫物への残留回避のため、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	10アール 当り 使用量	総使用回数*	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ オモダカ	移植後15~50日 (但し収穫60日前まで)	砂壤土~粘土 (減水深1.5 cm/日以下)	3~4 kg	本剤: 1回 ベンタゾン: 2回	全域(九州を除く)の普通期 及び早期栽培地帯
		移植後15~40日 (但し収穫60日前まで)				九州の普通期 及び早期栽培地帯
	クログワイ	移植後15~35日 (但し収穫60日前まで)				東北、北陸、関東・東山・東海 の普通期栽培地帯
	エゾノサヤマカグサ	移植後15~55日 (但し収穫60日前まで)				北海道
	シズイ	移植後25~55日 (但し収穫60日前まで)				東北

【使い方】

- 落水散布又はごく浅い湛水散布。
- 移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用する。