

平成22年12月13日

各位

住友化学株式会社

新規水稲用初・中期一発処理除草剤
「ゼータワン[®]剤」・「メガゼータ[®]剤」の登録について

住友化学株式会社(以下「住友化学」)は、新規水稲用初・中期一発処理除草剤「ゼータワン[®]剤(1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ)」、および「メガゼータ[®]剤(1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ)」の農薬登録を2010年12月13日付けで取得しました。

「ゼータワン[®]剤」および「メガゼータ[®]剤」はいずれも、住友化学が新規開発した成分「プロピリスルフロン(一般名)」を含有する水稲用初・中期一発処理除草剤です。

プロピリスルフロンは、ノビエをはじめ、幅広い一年生雑草・多年生雑草に高い効果を示します。このため、1成分で初・中期一発処理除草剤としての性能を有する画期的な除草剤です。

「ゼータワン[®]剤」はプロピリスルフロンの単剤で、「メガゼータ[®]剤」はプロピリスルフロンとピラクロニルとの混合剤です。いずれも成分数の少なさにより、減農薬栽培にも適した製品です。また、多様な使用方法のニーズにお応えするために、いずれも3剤型(1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ)を取り揃えております。

なお、「ゼータワン[®]剤」および「メガゼータ[®]剤」の販売開始は、2011年春を予定しております。

住友化学は、「ゼータワン[®]剤」および「メガゼータ[®]剤」により、これまで以上に水稲雑草防除の製品拡充に貢献できるものと考えています。また、今後も農作物の生産性および品質向上への一層の貢献を目指し、さまざまなお客様のニーズにお応えする製品のラインアップの拡充を進めてまいります。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

住友化学株式会社 アグロ事業部 普及部(TEL:03-5543-5606)

ゼータワン[®]1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ登録内容

【 名 称 】 :ゼータワン1キロ粒剤

【 登 録 番 号 】 :第22834号

【 有 効 成 分 】 :プロピリスルフロン…0.90%

【 適 用 と 使 用 法 】 :以下のとおり

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草 及 び マ ツ パ イ ホ タ ル イ ウ リ カ ワ ミズガヤツリ (北海道を除く) ヘラオモダカ (北 海 道) ヒ ル ム シ ロ セ リ (九州を除く)	移植後 5 日～ 比 ¹ 2.5 葉期 た だ し、 移植後 30 日 ま で	砂 壤 土 ～ 埴 土	1kg /10a	2 回以内	湛水 散布	全域の普通期 及び早期栽培 地 帯

プロピリスルフロンを含む
農薬の総使用回数

2回以内

【名称】:ゼータワンフロアブル

【登録番号】:第22836号

【有効成分】:プロピリスルフロン…1.7%

【適用と使用法】:以下のとおり

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ (北海道を除く)	移植後5日～ L ¹ E ^{2.5} 葉期 ただし、移植 後30日まで	砂壤土 ～ 埴土	500 mL /10a	2回以内	原液湛水 散布	東北
	壤土 ～ 埴土		全域(東北 を除く)の 普通期及 び早期栽 培地帯				

プロピリスルフロンを含む 農薬の総使用回数
2回以内

【 名 称 】 :ゼータワンジャンボ

【 登 録 番 号 】 :第22844号

【 有 効 成 分 】 :プロピリスルフロン…2. 25%

【 適 用 と 使 用 法 】 :以下のとおり

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ (北海道、東北) ミズガヤツリ (北海道を除く) ウリカワ ヒルムシロ セ エソノサヤヌカクサ (北海道) オモダカ クログワイ (北海道を除く) コウキヤガラ (関東・東山・東海、九州)	移植後5日～ 3葉期 ただし、移植 後30日まで	砂壤土 ～埴土	小包装 (パック) 10個 (400g) /10a	1回	水田に 小包装(パック) のまま投げ 入れる。	全域の普 通期及び 早期栽培 地帯

プロピリスルフロンを含む
農薬の総使用回数

2回以内

メガゼータ[®]1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ登録内容

【 名 称 】 :メガゼータ1キロ粒剤

【 登 録 番 号 】 :第22842号

【 有 効 成 分 】 :ピラクロニル…2.0% プロピリスルフロン…0.90%

【 適 用 と 使 用 法 】 :以下のとおり

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ (北海道を除く) ヘラオモダカ (北海道、東北)	移植後5日～ L ¹ 3葉期 ただし、 移植後30日 ま	壤土 ～ 埴土	1kg /10a	1回	湛水 散布	北海道
	ヒルムシロ (北陸を除く) セ リ エソ ^ノ ノサヤヌカク ^サ (北海道)		砂壤土 ～ 埴土				全域(北海道、 九州を除く)の 普通期及び早 期栽培地帯
	オモダカ (北海道) アオミドロ・ 藻類による 表層はく離 (北海道、東北を除く)	移植後5日～ L ¹ 2.5葉期 ただし、 移植後30日 ま					九州の普通期 及び早期栽培 地帯

ピラクロニルを含む 農薬の総使用回数	プロピリスルフロンを含む 農薬の総使用回数
2回以内	2回以内

【 名 称 】 :メガゼータジャンボ

【 登 録 番 号 】 :第22838号

【 有 効 成 分 】 :ピラクロニル…5.0% プロピリスルフロン…2.25%

【 適 用 と 使 用 法 】 :以下のとおり

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植 水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	(北海道、東北)ノビ [・] Ⅰ3葉期 ただし、移植後30日まで	壤土 ～埴土	小包装 (パック) 10個 (400g) /10a	1回	水田に 小包装(パック) のまま投げ入 れる。	北海道
		(北陸、関東・東 山・東海、近畿・中 国・四国) 移植後5日～ ノビ [・] Ⅰ2.5葉期 ただし、移植後 30日まで	砂壤土 ～埴土				全域(北海道、 九州を除く)の 普通期及び早 期栽培地帯
							九州の普通 期及び早期 栽培地帯

ピラクロニルを含む 農薬の総使用回数	プロピリスルフロンを含む 農薬の総使用回数
2回以内	2回以内