

平成24年11月21日

各位

住友化学株式会社

アグロスリン乳剤の登録内容変更に関するご案内

拝啓

時下ますますご隆盛の段、お喜び申し上げます。平素は格別のご指導を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、首記の件、平成24年11月21日付けで使用制限を伴う登録変更が実施されましたので、下記の通りお知らせ申し上げます。

ご使用に際しましては、変更後の適用内容を遵守いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象となる農薬

登録番号	農薬名（商品名）	登録会社
第16589号	アグロスリン乳剤	住友化学株式会社

2. 登録変更の時期

平成24年11月21日（水）

3. 登録変更の内容

別紙のとおり

4. 登録変更の理由

現在の登録内容の維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。

5. 今後の対応

安全性に懸念の無い登録変更であるため、流通在庫品の回収などはありません。

【お問い合わせ先】

住友化学株式会社 お客様相談室

電話：0570-058-669（ナビダイヤル）または 03-5543-5607

以上

【変更内容】(下線部分は、使用制限に係る登録変更)

- ・作物名「かんきつ」の、本剤の使用回数およびシベルメトリンを含む農薬の総使用回数を「5回以内」から「3回以内」に変更する。
- ・作物名「非結球レタス」の使用時期を「収穫 14 日前まで」から「収穫 7 日前まで」、本剤の使用回数およびシベルメトリンを含む農薬の総使用回数を「5 回以内」から「2 回以内」に変更する。
- ・作物名「しそ(花穂)」を削除する。
- ・作物名「はっか」を「しそ科葉菜類(しそ、バジルを除く)」に変更する。
- ・作物名「バジル」の使用時期を「収穫 7 日前まで」から「収穫 3 日前まで」、本剤の使用回数およびシベルメトリンを含む農薬の総使用回数を「1 回」から「2 回以内」に変更する。
- ・作物名「食用プリムラ」および「食用金魚草」の使用時期を「収穫 7 日前まで」から「収穫 14 日前まで」、本剤の使用回数およびシベルメトリンを含む農薬の総使用回数を「1 回」から「2 回以内」に変更する。
- ・作物名「ほうれんそう」の使用時期を「収穫 7 日前まで」から「収穫 21 日前まで」に変更する。
- ・使用量を記載する。(「変更後の適用表」を参照)

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シベルメトリンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	チャノドアザミヤ ミカンハダガ アブラムシ類	1000～ 2000 倍	収穫 7 日前まで	<u>3 回以内</u>	散布	<u>3 回以内</u>
	コアカハダガ クキスイ類 カメムシ類	2000 倍				
非結球レタス	アブラムシ類	2000 倍	収穫 7 日前まで	<u>2 回以内</u>		<u>2 回以内</u>
しそ科葉菜類 (しそ、バジル を除く)	アブラムシ類	2000 倍	収穫 7 日前まで	1 回		1 回
バジル			収穫 3 日前まで	2 回以内		2 回以内
食用プリムラ 食用金魚草	アブラムシ類	1500 倍	<u>収穫 14 日前まで</u>	2 回以内		2 回以内

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シベルメトリンを含む農薬の総使用回数
ほうれんそう	ヨトウムシ アブラムシ類	2000 倍	<u>収穫 21 日前まで</u>	5 回以内	散布	5 回以内
	ミミキドアザミヤ	1000 倍				

前頁より続く

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シバ・ルトリンを含む農薬の総使用回数					
かんきつ	チャノイドアザミウマ ミカバエガリ、アブラムシ類	1000～2000 倍	200～700 L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内					
	コアカハナムケリ、ケンキスイ類 カメムシ類	2000 倍										
キウイフルーツ	キロマイコガ	1000～2000 倍	60～150 L/10a	収穫 21 日前まで								
	キウ化メコバエ	2000 倍										
麦類	アブラムシ類	2000 倍										
とうもろこし	アワノメイガ	1000～2000 倍	100～300 L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内			3 回以内				
	アワヨトウ	1000 倍										
	アブラムシ類	2000 倍										
だいず	マメシクイガ、カメムシ類 フタスジヒメハムシ ジャガイトビガ、ナガアブラムシ											
えだまめ	マメシクイガ、カメムシ類 フタスジヒメハムシ											
あずき	アブラムシ類、ノメイガ類											
いんげんまめ さやいんげん	アブラムシ類 インゲンテントウ											
きゅうり	アブラムシ類、オシツコナシ、ミミナミキロアザミウマ トマトハエガリ、ハエ	1000 倍		収穫前日まで	5 回以内		5 回以内					
	アブラムシ類	2000 倍										
すいか	アブラムシ類	2000 倍										
	ミナミキロアザミウマ	1000～2000 倍										
メロン	アブラムシ類	2000 倍										
	ミナミキロアザミウマ トマトハエガリ、ハエ	1000 倍										
かぼちゃ	アブラムシ類、アザミウマ類 ハスモンヨトウ	2000 倍										
トマト	アブラムシ類 オシツコナシ、ミミナミキロアザミウマ											
なす	ミナミキロアザミウマ	1000 倍										
ピーマン いちご	アブラムシ類	2000 倍										
ねぎ	ヨイチモシ、ヨトウ	1000 倍	2.4L/10a	収穫 7 日前まで		無人ヘリコプターによる散布						
	アブラムシ類、ナガコガ ナガハエガリ、ハエ アザミウマ類	2000 倍										
たまねぎ	アザミウマ類 ヨイチモシ、ヨトウ	48 倍										
にんじん	ヨトウムシ	2000 倍	100～300 L/10a		2 回以内	散布	2 回以内					
にら	ナガアザミウマ、ヨトウムシ類	2000 倍		収穫前日まで 収穫 14 日前まで	3 回以内		3 回以内					
にら（花茎）	ナガコガ、ハエガリ、ハエ類											
ごぼう	アブラムシ類											
ほうれんそう	ヨトウムシ、アブラムシ類				1000 倍		収穫 21 日前まで	5 回以内	5 回以内			
	ミナミキロアザミウマ											
チンゲンサイ	アオムシ、アブラムシ類	2000 倍		収穫前日まで	2 回以内		2 回以内					
こまつな	アブラムシ類				収穫 7 日前まで		5 回以内	5 回以内				
さぬきな				2 回以内			2 回以内					
レタス												
非結球レタス												

次頁に続く

前頁より続く

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアルトリンを含む農薬の総使用回数	
しそ	ヒメシヨコバ、イ、アブ、ラムシ類	2000 倍	100 ～ 300 L/10a	収穫 7 日前まで	1 回	散布	1 回	
食用ぎく	アブ、ラムシ類、アザミウマ類 オオタバコガ ハメシヨトリ、ヨトリムシ	1500 倍		収穫 3 日前まで				
たばこ	タバコアオムシ、ヨトリムシ	2000 ～ 3000 倍	25 ～ 180 L/10a	発生初期 ～ 収穫 10 日前まで	2 回以内		2 回以内	
きく	アブ、ラムシ類	2000 倍	100 ～ 300 L/10a	発生初期	6 回以内		6 回以内	
カーネーション	アブ、ラムシ類、ヨトリムシ類							
しきみ さかき	アブ、ラムシ類		200 ～ 700 L/10a					
しそ科葉菜類 (しそ、バジルを 除く)			100 ～ 300 L/10a	収穫 7 日前まで	1 回		1 回	
バジル				収穫 3 日前まで	2 回以内		2 回以内	
食用ブロッコリー 食用金魚草		1500 倍		収穫 14 日前まで				
わけぎ	シロイモシ、ヨトリ	1000 倍	100 ～ 300 L/10a	収穫 3 日前まで	3 回以内 5 回以内 2 回以内		3 回以内 5 回以内 2 回以内	
未成熟さざげ	アブ、ラムシ類	2000 倍		収穫前日まで				
葉にんにく	アザミウマ							
らっきょう								
エンサイ	ハメシヨトリ							
飼料用えんばく (は種用種子)	コナストムシ、キ	300 倍	種子 1 kg 当り希釈液 20mL	貯蔵前	1 回	種子吹き付け処理 又は塗沫処理	1 回	

【使用上の注意事項の変更】

・「適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。」を追加する。