

平成25年1月30日

各位

住友化学株式会社

ダイアジノン水和剤34の登録内容変更に関するご案内

拝啓

時下ますますご隆盛の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、首記の件、平成25年1月30日付けで使用制限を伴う登録変更が実施されましたので、下記の通りお知らせ申し上げます。

ご使用に際しましては、変更後の適用内容を遵守いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象となる農薬

登録番号	農薬名（商品名）	登録会社
第18039号	アグロス ダイアジノン水和剤34	住友化学株式会社

2. 登録変更の時期

平成25年1月30日（水）

3. 登録変更の内容

別紙の通り

4. 登録変更の理由

現在の登録内容の維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。

5. 今後の対応

安全性に懸念の無い登録変更であるため、流通在庫品の回収などは行いません。

【お問い合わせ先】

住友化学株式会社 お客様相談室

電話：0570-058-669（ナビダイヤル）または 03-5543-5607

以上

(別紙)

【変更内容】(下線部分は、使用制限に係る登録変更)

- ・作物名「ブロッコリー、カリフラワー」のダイアジノンを含む農薬の総使用回数「2回以内」を「2回以内(粒剤の生育期の処理は1回以内)」に変更する。
- ・作物名「すいか、メロン、かぼちゃ」のダイアジノンを含む農薬の総使用回数「4回以内」を「4回以内(粒剤の生育期の処理は3回以内)」に変更する。
- ・作物名「なす(露地栽培)」のダイアジノンを含む農薬の総使用回数「3回以内」を「3回以内(粒剤の生育期の処理は2回以内)」に変更する。
- ・作物名「なす(露地栽培)」の使用時期「収穫3日前まで」を「収穫開始3日前まで」に変更する。
- ・作物名「おうとう」のダイアジノンを含む農薬の総使用回数「2回以内(休眠期は1回以内)」を「2回以内」に変更する。
- ・作物名「りんご」のダイアジノンを含む農薬の総使用回数「4回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内)」を「4回以内」に変更する。
- ・作物名「みかん、トマト、まくわうり」を削除する。
- ・作物名「もも」のダイアジノンを含む農薬の総使用回数「4回以内(休眠期は3回以内)」を「4回以内」に変更する。
- ・使用液量を以下の表のとおり追加する。

次頁に続く

前頁より続く

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	ダブリン を含む 農薬の 総使用回数
りんご	モモシンクイガ、ナシヒメシンクイ リンゴハナゾウムシ モンシロドクガ、リンゴフユシヤク リンゴワタムシ	1000倍	200 ~700 L/10a	収穫30 日前まで	4回 以内	散布	4回以内
	クワコナカイガラムシ若齢幼虫 ハマキムシ類、アブラムシ類 オオワタコナカイガラムシ若齢幼虫 ナシグンバイ、キンモンホソガ アメリカシロヒトリ	1000~ 1500倍					
日本なし 西洋なし	コナカイガラムシ類若齢幼虫 ハマキムシ類、アブラムシ類 ナシグンバイ、アメリカシロヒトリ	1000倍		収穫14 日前まで	6回 以内		6回以内 (休眠期は 1回 以内)
	モンシロドクガ、シンクイムシ類						
もも	シンクイムシ類	1000~ 1500倍		収穫前日 まで	4回 以内		4回以内
	クワコナカイガラムシ若齢幼虫 ハマキムシ類、アブラムシ類						
ネクタリン	シンクイムシ類	1000~ 1500倍		収穫21 日前まで	3回 以内		3回以内
	クワコナカイガラムシ若齢幼虫 ハマキムシ類、アブラムシ類						
おうとう	アブラムシ類、ハマキムシ類 ナシグンバイ、アメリカシロヒトリ	1000倍		収穫14 日前まで	2回 以内		2回以内
	ウメシロカイガラムシ						
小粒核果類 (すももを 除く)	シンクイムシ類	1000~ 1500倍		収穫21 日前まで			2回以内
	アブラムシ類、ハマキムシ類 アメリカシロヒトリ						
すもも	シンクイムシ類	1000倍			4回 以内		4回以内
大粒種ぶどう	クワコナカイガラムシ若齢幼虫 ハマキムシ類、アブラムシ類 ミドリヒメヨコバイ	1000~ 1500倍		収穫30 日前まで	2回 以内		2回以内
かき	オオワタコナカイガラムシ若齢幼虫 ハマキムシ類 アメリカシロヒトリ	1000倍		収穫45 日前まで	4回 以内		4回以内

次頁に続く

前頁より続く

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	ダ イ ジ ャ ン を含む 農薬の 総使用回数
キャベツ	キボシマルトビムシ	600倍	100 ~300 L/10a	収穫30日 前まで	2回 以内	散布	2回以内
	コナガ、アブラムシ類	2000倍					
	キスジノミハムシ、アオムシ	1000倍					
ブロッコリー カリフラワー	キボシマルトビムシ	600倍					
	コナガ、アブラムシ類	2000倍					
	キスジノミハムシ、アオムシ	1000倍					
ほうれんそう	アブラムシ類	2000倍		収穫21 日前まで			2回以内（は 種時及びは 種前の土壌 混和は合計 1回以内）
ねぎ	アザミウマ類	600~ 1000倍					2回以内
	ネギハモグリバエ	600倍					
	たまねぎ	アブラムシ類					
	アザミウマ類	1000倍	収穫14 日前まで	3回 以内		3回以内	
にんにく	ネギコガ						
しろうり	キボシマルトビムシ	600倍	収穫21 日前まで	4回 以内		4回以内（粒 剤の生育期 の処理は3 回以内）	
	アブラムシ類	2000倍					
	ハダニ類	600~ 1000倍					
すいか メロン	キボシマルトビムシ	600倍					
	アブラムシ類	2000倍					
	ハダニ類	600~ 1000倍					
かぼちゃ	キボシマルトビムシ	600倍	収穫21 日前まで			4回以内（粒 剤の生育期 の処理は3 回以内）	
	アブラムシ類	2000倍					
	ハダニ類	600~ 1000倍					
なす （露地栽培）	テントウムシダマシ	2000倍	収穫開始 3日前ま で	3回 以内		3回以内（粒 剤の生育期 の処理は2 回以内）	
	アブラムシ類						
	ハダニ類	1000倍					
ばれいしょ	テントウムシダマシ アブラムシ類	2000倍	収穫7日 前まで			3回以内（植 付前の土壌 混和は1回 以内）	
樹木類	アメリカシロヒトリ	1000~ 1500倍	200 ~700 L/10a	発生初期	4回 以内		4回以内

次頁に続く

前頁より続く

使用上の注意事項の変更

- ・「適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。」を追加する。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。