

平成25年1月30日

各位

住友化学株式会社

ダイアジノン乳剤40の登録内容変更に関するご案内

拝啓

時下ますますご隆盛の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、首記の件、平成25年1月30日付けで使用制限を伴う登録変更が実施されましたので、下記の通りお知らせ申し上げます。

ご使用に際しましては、変更後の適用内容を遵守いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象となる農薬

登録番号	農薬名（商品名）	登録会社
第18136号	アグロス ダイアジノン乳剤40	住友化学株式会社

2. 登録変更の時期

平成25年1月30日（水）

3. 登録変更の内容

別紙の通り

4. 登録変更の理由

現在の登録内容の維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。

5. 今後の対応

安全性に懸念の無い登録変更であるため、流通在庫品の回収などは行いません。

【お問い合わせ先】

住友化学株式会社 お客様相談室

電話：0570-058-669（ナビダイヤル）または 03-5543-5607

以上

## (別紙)

【変更内容】(下線部分は、使用制限に係る登録変更)

- ・ 作物名「ブロッコリー、カリフラワー」のダイアジノンを含む農薬の総使用回数「2回以内」を「2回以内（粒剤の生育期の処理は1回以内）」に変更する。
- ・ 作物名「なす（露地栽培）」のダイアジノンを含む農薬の総使用回数「3回以内」を「3回以内（粒剤の生育期の処理は2回以内）」に変更する。
- ・ 作物名「なす（露地栽培）」の使用時期「収穫3日前まで」を「収穫開始3日前まで」に変更する。
- ・ 作物名「さやいんげん」の使用時期「収穫7日前まで」を「収穫開始7日前まで」に変更する。
- ・ 作物名「さやえんどう、実えんどう」の使用時期「収穫14日前まで」を「収穫開始14日前まで」に変更する。
- ・ 作物名「すいか、メロン」のダイアジノンを含む農薬の総使用回数「4回以内」を「4回以内（粒剤の生育期の処理は3回以内）」に変更する。
- ・ 作物名「きゅうり」の使用時期「は種時又は植付時」を「植付時」に変更し、本剤の使用回数「2回以内」を「1回」に変更する。
- ・ 作物名「トマト、しろうり、まくわうり、かぼちゃ、もも」を削除する。
- ・ 使用液量を以下の表のとおり変更する。
- ・ 作物名「芝」の使用方法を「散布」に変更する。

次頁に続く

前頁より続く

別紙1

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイゾルを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アオムシ、コナガアブラムシ類	1000倍	100 ~300 L/10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	2回以内
	キスジノミハムシ	1200倍					
ブロッコリー カリフラワー	アオムシ、コナガアブラムシ類	1000倍					
	キスジノミハムシ	1200倍					
	キボシマルトビムシ	700倍					
ほうれんそう	アブラムシ類	1000倍					
ねぎ わけぎ	アブラムシ類 ネギコガ	700 ~1200倍		収穫30日前まで			
	アザミウマ類						
	ネギハモグリバエ						
	タマネギバエ						
あさつき	アブラムシ類 ネギコガ	700 ~1200倍	収穫30日前まで				
	アザミウマ類						
	ネギハモグリバエ						
	タマネギバエ						
たまねぎ	アブラムシ類	700 ~1200倍	収穫21日前まで				
	アザミウマ類						
	ネギハモグリバエ						
	タマネギバエ						
なす (露地栽培)	アブラムシ類 テントウムシダマシ	1000倍	収穫開始3日前まで	3回以内	3回以内(粒剤の生育期の処理は2回以内)		
	ハダニ類	1000 ~2000倍					
ばれいしょ	アブラムシ類 テントウムシダマシ	1000倍	収穫7日前まで	3回以内(植付前の土壌混和は1回以内)			
さやいんげん	アブラムシ類	1000 ~2000倍	収穫開始7日前まで		2回以内	3回以内(種子粉衣は1回以内、乳剤は2回以内)	
	ハダニ類						

次頁に続く

前頁より続く

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイズ <sup>®</sup> を含む農薬の総使用回数
さやえんどう 実えんどう	アブラムシ類	1000倍	100 ~300 L/10a	収穫開始14 日前まで	3回 以内	散布	4回以内（種子粉 衣は1回以内、乳 剤は3回以内）
	ハダニ類	1000 ~2000倍					
すいか メロン	アブラムシ類	1000倍		収穫14日前 まで	4回 以内		4回以内（粒剤の 生育期の処理は3 回以内）
	ハダニ類	1000 ~2000倍					
	キボシマルトビムシ	700倍					
きゅうり	アブラムシ類	1000倍		植付時	1回		2回以内
	ハダニ類	1000 ~2000倍					
芝	コガネムシ類幼虫	800倍	3L/m <sup>2</sup>	発生初期	4回 以内	4回以内	
	シバツトガ スジキリヨトウ	1000倍	0.3~ 1L/m <sup>2</sup>				
	シバオサゾウムシ		0.3 ~0.5 L/m <sup>2</sup>				

#### 使用上の注意事項の変更

・「スギタマバエ防除に使用する場合、虫えい形成期（通常6～7月）に樹冠全面に十分散布すること。」を  
削除する。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。